

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 การออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อแมลง

ปัจจุบันการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อป้องกันหรือกำจัดแมลงศัตรูพืชมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพง มีอันตรายต่อคนและสัตว์ เกิดสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังทำลายสภาพแวดล้อม สารสกัดจากพืชได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและกำลังได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เพราะเป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติสลายตัวได้ง่ายในสภาพธรรมชาติ และมีอันตรายต่อผู้ใช้น้อยกว่าสารเคมีสังเคราะห์ ขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพรรณพืชและได้มีการทดลองสารที่สกัดได้จากพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายร้อยชนิดเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงที่มีความสำคัญทางการเกษตร ทางการแพทย์ และสัตวแพทย์ ซึ่งในที่นี้ขอสรุปรายงานถึงการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อแมลงที่พอสรุปได้เป็น 4 ประการ คือ

2.1.1 **สารสกัดที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลง (Insecticidal Activity)** สารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงซึ่งเกษตรกรนิยมใช้มานานแล้ว คือ ไล่ดิน ที่ได้จากต้นหางไหล และยาสูบจากใบยาสูบโดยสามารถนำมาผสมน้ำ ฉีดฆ่าแมลงทั้งชนิดปากกัดและปากดูดได้ผลดี และต่อมาทราบว่าสารสกัดที่ได้จากต้นหางไหล คือ โรทีโนน และสารสกัดจากใบยาสูบ คือ นิโคติน (สุภาณี ทิมพ์สมาน, 2532 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 5)

2.1.2 **สารสกัดที่มีฤทธิ์ทำให้ชะบวนการเจริญเติบโตของแมลงวันมดปกติ (Insect Growth Regulation)** สารสกัดกลุ่มนี้จะไม่ทำให้แมลงตายทันทีแต่จะเกิดความผิดปกติของวงจรชีวิตและมักตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ การวางไข่น้อยกว่าปกติหรือทำให้กระบวนการลอกคราบ

ของแมลงชนิดปกติ (Osman, 1993 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 5) ผนังลำตัวบางลงหลังการลอกคราบจึงอ่อนแอ และมีอัตราการตายสูง เช่น สารสกัดจากเมล็ดสะเดา มีผลทำให้หนอนใยผักมีอัตราการวางไข่ลดลงจากปกติร้อยละ 20 – 100 ทั้งนี้ขึ้นกับความเข้มข้นของสารที่ได้รับ (Joshi et al., 1978 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 5)

2.1.3 สารสกัดที่มีฤทธิ์ไล่หรือดึงดูดแมลง (Repellent หรือ Attractant) สารที่มีฤทธิ์ไล่แมลงมักมีกลิ่นและไล่แมลงได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อกลิ่นระเหยหมดไปแมลงจะกลับมารบกวนอีก เช่น กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศต่าง ๆ ได้แก่ กระชาย กะเพรา กานพลู เป็นต้น ส่วนสารบางประเภทมีกลิ่นล่อแมลงให้มารวมกัน ตัวอย่างเช่น ดอกเดหลีใบกล้วย ช่วยล่อแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง (*Dacus dorsalis* Hendel) ทำให้กำจัดได้ง่ายโดยใช้สารฆ่าแมลงประเภทมาลาไรออนฉีดที่ปลีดอกในตอนเช้า เมื่อแมลงวันผลไม้บินมาเกาะที่ปลีดอกจะสัมผัสกับยาที่มีผลทำให้แมลงตาย

2.1.4 สารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการกินหรือการทำลายของแมลง (Antifeedant หรือ Feeding Deterrent) สารสกัดประเภทนี้มักจัดอยู่ในกลุ่มสารอัลคาลอยด์และเทอร์พีนอยด์ เช่น สารสกัดจากใบจั๊ตสรรวรรค์ ต้นครามป่า และสะเดา เป็นต้น (Verkerk and Wright, 1993 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 6)

2.2 พฤกษศาสตร์ของต้นหนอนตายหยาก

นักพฤกษศาสตร์ด้านอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ได้จำแนกกลุ่มและเรียงลำดับไว้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2528 อ้างถึงใน เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 3)

Division	Embryophyta
Subdivision	Angiospermae
Class	Monocotyledoneae
Order	Liliales
Family	Stemonaceae
Genus	Stemona

ตารางที่ 2.1 ชนิดของพืชในสกุล *Stemona* spp. ที่พบในประเทศไทย

ชนิด	ชื่อท้องถิ่น	จังหวัดที่พบ
<i>Stemona aphylla</i> Craib	เครือปุง	แพร่ ลำปาง
<i>Stemona asperula</i> J.J.Sm.	ไม่มีรายงานชื่อไทย	ไม่ระบุจังหวัด
<i>Stemona burkillii</i> Prain	ปงมดง่าม ปองมดง่าม	ดอยสุเทพ เชียงใหม่
<i>Stemona collinsae</i> Craib	ปงช้าง หนอนตายหยาก	ภาคเหนือและภาคกลาง (ไม่ระบุจังหวัด) และ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
<i>Stemona curtisii</i> Hk. f.	รากลิง หนอนตายหยาก	พัทลุง จันทบุรี
<i>Stemona griffithiana</i> Kurz	ไม่มีรายงานชื่อไทย	แพร่
<i>Stemona hutanguriana</i> W. sp. nov.	ไม่มีรายงานชื่อไทย	อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
<i>Stemona kerrii</i> Craib	ไม่มีรายงานชื่อไทย	ดอยสุเทพ เชียงใหม่
<i>Stemona phyllantha</i> Gagnep.	ไม่มีรายงานชื่อไทย	เพชรบุรี ภูเก็ต
<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	กะเพียด หนอนตายหยาก	ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน

แหล่งที่มา: เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2508; พยอม ตันติวัฒน์, 2521; เต็ม สมิตินันท์, 2523;

Gagnepain, 1934; Konoshima, 1973; Duyfjes, 1993; Wongsati, 2000 อ้างถึงใน
เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 6.

2.3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหนอนตายหยาก (*Stemona tuberosa* Lour.)

Prain (1905 อ้างถึงใน เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 9) และ Duyfjes (1993 อ้างถึงใน เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 9) ได้บรรยายลักษณะของ *Stemona tuberosa* Lour. นี้ว่า ลำต้นไม่มีขน เลื้อยยาวได้ถึง 4 เมตร รากอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นจำนวนมาก เป็นทู่เบอร์สรูท เปลือกมีสี เหลืองหรือดำ ยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร ใบติดกันแบบตรงกันข้าม ส่วนปลายยอดจะติดแบบ สลับ ตัวใบรูปไข่ ขนาดใหญ่ยาว 9 – 19.5 เซนติเมตร กว้าง 3 – 14 เซนติเมตร ฐานใบเว้ารูปหัวใจ ปลายแหลม มีเส้นใบ 9 – 13 เส้น ก้านใบยาว 1.5 – 7 เซนติเมตร กลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวหรือสี เขียวเหลือง มีลายเส้นยาวสีเขียวเข้มหรือสีม่วง หรือมีสีเขียวยาวตลอดถึงปลาย กลีบดอกด้านในมี สีม่วงหรือสีแดงน้ำตาล และมีลายสีแดง ขนาดของกลีบดอกยาว 25 – 50 มิลลิเมตร กว้าง 4 – 10 มิลลิเมตร เกสรตัวผู้มีสีม่วงยาว 25 – 40 มิลลิเมตร อับเรณูยาว 8 – 15 มิลลิเมตร มี 2 ช่องแยก จากกันโดยมีเส้นกลางสูง 1 – 1.5 มิลลิเมตร มีระยะยาว 5 – 12 มิลลิเมตร ส่วนปลายเชื่อม รวมกัน ผลมีสีเขียวยาว 40 – 70 มิลลิเมตร กว้าง 15 – 20 มิลลิเมตร ภายในมีเมล็ด 10 – 20 เมล็ด เมล็ดมีขนาดยาว 9 – 17 มิลลิเมตร ปลายแหลมยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ก้านเมล็ดยาว 8 มิลลิเมตร ตอนโคนมี Aril ปกคลุม

2.3.1 จำแนกลักษณะ *Stemona tuberosa* Lour. นี้ออกเป็น 2 Variety คือ

2.3.1.1 Var. *Tuberosa* ก้านดอกย่อยช่อดอกเป็นอิสระ ไม่เชื่อมรวมกับก้านใบ

2.3.1.2 Var. *Ternatensis* ก้านดอกย่อยจะเชื่อมรวมกับก้านใบ ยาว 5 – 30 มิลลิเมตร มีความสัมพันธ์คล้ายคลึงกับ *Stemona phyllantha* Gagnep จากประเทศไทย แต่ ต่างกันตรงที่ก้านดอกย่อยมีเพียงบางส่วนเชื่อมรวมกับก้านใบ และมี Perianth ขนาดใหญ่ กลีบ ดอกมีขนาด 60 มิลลิเมตร หรือยาวกว่านั้น

2.4 การขยายพันธุ์หนอนตายหยากตามธรรมชาติ

การขยายพันธุ์หนอนตายหยากตามธรรมชาติแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การขยายพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ และการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ

2.4.1 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Propagation)

ทำได้โดยการนำกระจุกราก (Tuberous) ไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง เช่น ในที่เลื่อยหรือเวอริมิคูไลต์ ถ้าเก็บรักษาเปิดโล่งจะทำให้เหี่ยว แบ่งกระจุกรากก่อนปลูกเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับสภาพอุ่นและชื้น ตาจะเจริญขึ้นจากลำต้นที่หดสั้นเหนือกระจุกราก จากนั้นจึงตัดแบ่งรากตามจำนวนตาที่อยู่เหนือกระจุกรากที่เกิดขึ้นแล้วแยกออกไปปลูกเป็นต้นกล้าใหม่

2.4.2 การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual Propagation)

โดยเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าให้เจริญเป็นต้นใหม่ต่อไป การขยายพันธุ์ลักษณะนี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืชจำนวนมาก แต่ต้นที่ได้จะโตช้าและกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลาานาน (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2531 อ้างถึงใน เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 18 – 20)

2.5 สารสำคัญของพืชวงศ์ Stemonaceae

การศึกษาด้านสารเคมีสำคัญของพืชในวงศ์ Stemonaceae ที่มีรายงานไว้ พบว่า อยู่ในกลุ่ม Polycyclic Alkaloids ที่มีโครงสร้างซับซ้อน แบ่งได้ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ (Pilli and Ferreira de Oliveria, 2000 อ้างถึงใน บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ, 2548: 4 – 5)

2.5.1 Stenine Alkaloids สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ Stenine, Tubero-stemonine, Tubero-stemonineA, Tubero-stemonol, Dihydro-tubero-stemonine, Bisdehydro-neo-tubero-stemonine, Neo-tubero-stemonine และ Oxotubero-stemonine

2.5.2 Stemoamide Alkaloids สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ Stemoamide, Stemonine, Neostemonine, Bisdehydro-neo-stemonine, Proto-stemonine, Didehydro-protostemonine, Iso-protostemonine, Tubero-stemonamide, Stemoninine และ Neostemodiol

2.5.3 Tubero-stemospironine Alkaloids สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ Tubero-stemospironine croomine, Stemospironine, Stemotinine, Iso-stemotinine, Stemonidine และ Didehydro-croomine

2.5.4 Stemonamine Alkaloids สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่

Stemonamine, Isostemonamine, Stemonamide, Isostemonamide, Maistemone และ Oxymaistemone

2.5.5 Parvistemoline Alkaloids สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่

Parvistemoline, Parvistemone และ Didehydroparvistemone

2.5.6 กลุ่มอื่นๆ ได้แก่

Stemofoline, Oxystemofoline, Methoxystemofoline, Parvistemoninine, Parvistemoninol, Tuberstemonone, Tuberstemoninol และ Parvistemonamide

รายงานสารอัลคาลอยด์ที่พบในหนอนตายหยากสปีชีส์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สารอัลคาลอยด์ที่พบในหนอนตายหยากสปีชีส์ต่าง ๆ

Compound	Plant Origins
Tuberstemone	<i>S. tuberosa</i> <i>S. sessilifolia</i>
Stenine	<i>S. tuberosa</i>
Oxotuberstemone	<i>S. tuberosa</i> <i>S. sessilifolia</i>
Protostemone	<i>S. japonica</i>
Stemone (C ₁₇ Alkaloid)	<i>S. ovata</i>
Stemone (C ₂₂ Alkaloid)	<i>S. tuberosa</i>
Stemonamine	<i>S. japonica</i>
Isostemonamine	<i>S. japonica</i>
Stemonidine	<i>S. ovata</i>
Stemotinine	<i>Stemona</i> spp. <i>S. tuberosa</i>

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)

Compound	Plant Origins
Isostemotinine	<i>S. tuberosa</i>
Croomine	<i>Stemona</i> spp.
Stemonfoline	<i>S. japonica</i> (Leave and Stem)
Stemoninine	<i>Stemona</i> spp.
Stemospironine	<i>S. japonica</i> (Leave and Stem)

แหล่งที่มา: Tang and Eisenbrand, 1992 อ้างถึงใน กฤตชญา อีสกุล, 2547: 7.

นักวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศได้มีการศึกษาสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และสารอื่นในรากหนอนตายหยากชนิดต่าง ๆ โดยในช่วงปี ค.ศ. 1934 – 1958 มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นทำการแยกสารอัลคาลอยด์ (Alkaloid) จาก *Stemona tuberosa* Lour. พบว่า มีสารอัลคาลอยด์ คือ Stemonidine ($C_{19}H_{30}O_5N$), Tuberstemone ($C_{22}H_{23}O_4N$), Isotuberstemone, Hypotuberstemone และ Oxatuberstemone และต่อมาได้มีการศึกษาโครงสร้างของ Tuberstemone อีกด้วย Ye et al. (1994 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 8) ได้ทำการศึกษาพบอัลคาร์ลอยด์ในหนอนตายหยากเพิ่มเติม ได้แก่ ทูเบอร์สเตโมนิโนล (Tuberostemoninol) สเตโมนิโนเอไมด์ (Stemoninoamide) นีโอทูเบอร์สเตโมนิน (Neotuberostemonine) และบีสดีไฮโดรนีโอทูเบอร์สเตโมนิน (Bisdehydroneotuberostemonin) ต่อมา Kinoshita and Mori (1996 อ้างถึงใน วาสนา ไชยคำ, 2545: 8) ศึกษาพบว่า สเตโมเอไมด์ (Stemoamide) เป็น Polycyclic Alkaloids ชนิดหนึ่งที่แยกได้จากรากพืชตระกูล Stemonaceae ซึ่งมีศักยภาพสูงในการฆ่าแมลง

สำหรับประเทศไทย เทพ เชียงทอง และวิจิตร ภัคเกษม (2517 อ้างถึงใน อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะ, 2546: 3) และ สุภาพ บุญยะรัตเวช และสมหมาย ประรัภกะโม (2523 อ้างถึงใน อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์และคณะ, 2546: 3) ได้ทำการทดสอบประเภทสารเคมีในพืชสมุนไพร และรายงานว่ ในส่วนของรากและลำต้นหนอนตายหยากให้ผลบวกกับอัลคาลอยด์ รีเจนต์ (Alkaloid Reagent) และสารออกฤทธิ์ที่ถูกสกัดมาด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ประกอบด้วยสารที่เรียกว่า Stemonacetal, Stemonal และ Stemonone ซึ่งสารเหล่านี้เป็นพวก Oxygen Ring Compounds ซึ่งมี Skeleton Structure เหมือนพวก Rotenone ที่สกัดมาจากพืชหลายชนิดที่ใช้ในการกำจัดแมลง เช่น รากของหางไหลหรือโล่ตีน

นอกจากนี้ Perry (1980 อ้างถึงใน สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด, 2544: 17 – 18) ได้รายงานถึงการใช้สมุนไพรหนอนตายหยากนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น ว่ามีใช้กันอยู่ประมาณ 6 ชนิด คือ *Stemona burbillii* Prain, *Stemona collinsae* Craib, *Stemona japonica* (Bl.) Miq., *Stemona moluccana* (Bl.) Wright, *Stemona sessilifolia* Miq. France. & Sav. และ *Stemona tuberosa* Lour. ซึ่งทั้ง 6 ชนิดนี้ มีสรรพคุณทางยา และมีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงด้วยกันทุกชนิด รวมทั้ง Bensky และ Gamble (1986 อ้างถึงใน กฤตชญา อิศกุล, 2547: 8) รายงานฤทธิ์อื่น ๆ ของหนอนตายหยากที่นอกเหนือจากการเป็นสารกำจัดแมลง ได้แก่ ความสามารถในการเป็นสารกำจัดแบคทีเรียก่อโรค (Pathogenic Bacteria) ได้หลายชนิด รวมทั้ง *Streptococcus pneumoniae* และ *Neisseria meningitides* นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต่อต้านแมลงที่เป็นปรสิต เช่น เหา เห็บ ไลน หมัดต่าง ๆ

2.6 ประโยชน์ของหนอนตายหยาก

มีรายงานว่าในรากหนอนตายหยากประกอบด้วยอัลคาลอยด์ Stemonine, Tuberostemonine, Stemonidine และ Isostemonidine ชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีเคยใช้รากหนอนตายหยากตำให้ละเอียดแล้วแช่ในน้ำมันมะพร้าว ใช้ฉีดเพื่อฆ่าแมลงในสวนพริกไท นอกจากนี้ชาวสวนพริกไทได้รู้จักการใช้รากหนอนตายหยาก (หรือกะเพียด) เป็นยาฆ่าแมลงของต้นพริกไทยมานานแล้ว ชาวเกาะสี่เกาะห้า อำเภอปากพูน จังหวัดพัทลุง ได้ใช้รากสิง โขลกทาฆ่าแมลงของปศุสัตว์ ชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้รากโป่งมดงามต้มผสมกับน้ำตาลให้มดกิน เร่งให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงออกมึนได้อีกด้วย แต่ในพม่าใช้เป็นยาฆ่าแมลง ใช้รากทุบละเอียดแช่น้ำฟอกล้างผม ฆ่าเหา ฟอกแผลต่าง ๆ ฆ่าหนอน ใส่ปากโหลปลาฆ่าหนอน และใช้ทำลายหิดได้ (พยอม ตันติวัฒน์, 2521: 142) ในด้านปศุสัตว์ สมจิตร พงษ์พงษ์ และสุภาพ ภูประเสริฐ (2534ข อ้างถึงใน สุภาณี พิมพ์สมาน และยนต์ สุตะภักดี, 2545: 5) รายงานว่า เกษตรกรใช้รากหนอนตายหยากตำละลายน้ำหยอดใส่แผลโคและกระบือ ที่มีหนอนแมลงวันไชอยู่จะสามารถฆ่าหนอนได้ดี วีระพล จันทรสวรรค์ และคณะ (2536ข อ้างถึงใน สุภาณี พิมพ์สมาน และยนต์ สุตะภักดี, 2545: 5) รายงานผลการศึกษาการใช้สารสกัดหนอนตายหยากที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 50 มีผลกำจัดเห็บโค (*Boophilus microplus* L.) ระยะตัวอ่อนได้ร้อยละ 100 และกำจัดตัวเต็มวัยได้ร้อยละ 93.3 ส่วนการใช้ในระดับเกษตรกร มีการนำรากหนอนตายหยากสดมาทุบพอแหลกและแช่น้ำทิ้งไว้ค้าง

คืน กรองเอาส่วนน้ำไปเจือจางผสมน้ำอีกครั้งเพื่อใช้ฉีดพ่น นอกจากนั้นยังใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสกัดชีวภาพ ซึ่งส่วนผสมประกอบด้วยรากหนอนตายหยาก 15 กิโลกรัม กากน้ำตาล 15 กิโลกรัม ตะไคร้ทั้งต้น 5 กิโลกรัม และน้ำ 20 ลิตร (สุภาพ บริบูรณ์, 2546 อ้างถึงใน สุภาณี ทิมพ์สมาน และยนต์ สุตะภักดี, 2545: 5) รากหนอนตายหยากอีกชนิดหนึ่ง คือ *Stemona curtisii* มีคุณสมบัติในการฆ่าลูกน้ำยุงและหนอนแมลงวัน เมื่อนำลูกน้ำยุงที่ได้รับสารละลายรากหนอนตายหยากมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า มีความผิดปกติทางด้านกรหายใจ คือ ที่ปากท่อหายใจ (Abdominal Spiracles) และปลายสุดของ Siphon มีการปิดเปิดไม่ถูกจังหวะ ทำให้ลูกน้ำหายใจไม่ได้ และตายในที่สุด (ประคอง พันธุ์อุไร, 2520ข อ้างถึงใน กฤตชญา อิศกุล, 2547: 6) ปัจจุบันมีการผลิตสารสกัดจากหนอนตายหยากจำหน่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาในการปลูกประมาณ 1 ปีครึ่ง ก็สามารถเก็บรากสดนำมาสกัดเป็นหัวเชื้อ โดยอัตราส่วนน้ำยาต่อรากสด 1 : 10 คือ ปริมาณหัวสด 3,000 กิโลกรัม จะผลิตน้ำยา 300 ลิตร ซึ่งมีการสั่งซื้อจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ใช้เป็นหัวเชื้อขายในการใช้กำจัดเห็บ หมัด แมลง และไรในฟาร์มปศุสัตว์ โดยผสมน้ำยา 40 ซีซี ต่อ น้ำ 200 ลิตร มีประสิทธิภาพใช้ได้นาน 7 – 15 วัน (ทวีศักดิ์ เรืองชัยศ, 2542 อ้างถึงใน บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ, 2548: 9) ประคอง พันธุ์อุไร และคณะ (2523 อ้างถึงใน วราภรณ์ แก้วคอน, 2546: 5) ได้ทดสอบคุณสมบัติในการฆ่าเหาของรากหนอนตายหยาก (*Stemona curtisii* Hk. f.) โดยนำรากแห้งมาสกัดด้วยสารต่าง ๆ ได้แก่ คลอโรฟอร์ม แอลกอฮอล์ และน้ำ แล้วนำไปเตรียมตัวอย่างในรูปแบบของยาน้ำและครีม เพื่อทดสอบพิษในการฆ่าเหาและพบว่า มีพิษต่อเหาจริง นอกจากนี้สารสกัดจากรากหนอนตายหยากที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์และเตรียมในรูปแบบครีมจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเหาได้ดีที่สุด และยังได้ทดสอบหาพิษเฉียบพลันของยาน้ำสำเร็จที่สกัดด้วยน้ำต่อหนูขาว โดยเตรียมน้ำยาสกัดความเข้มข้นต่าง ๆ ป้อนให้หนูขาวกิน พบว่า ขนาดของน้ำยาสกัดร้อยละ 0.5 ต่อน้ำหนักตัว ทำให้หนูขาวตายแต่ไม่มีผลใด ๆ เกิดขึ้นเมื่อให้ปริมาณน้อยกว่านั้น เมธี รุ่งโรจน์สกุล (2542 อ้างถึงใน วราภรณ์ แก้วคอน, 2546: 5 – 6) ศึกษาผลของสารสกัดหนอนตายหยาก (*Stemona tuberosa* Lour.) ต่อโรคและแมลงศัตรูพืชในกุหลาบ พบว่า ความเข้มข้นของหนอนตายหยาก 50 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร เมื่อนำมาหมักที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 คืน สามารถกำจัดหนอนกัดดอก หนอนกัดใบ แมลงวัน เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยอ่อน ได้เช่นเดียวกับ สารคาร์โบซัลเฟน อนุฉัตร วิระฉัตร (2528 อ้างถึงใน เมธี รุ่งโรจน์สกุล, 2544: 15) กล่าวว่าการค่าความเข้มข้นที่ปลอดภัยของสารสกัดหนอนตายหยากต่อสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ มีความเป็นพิษรุนแรงต่อลูกน้ำยุงลายมากที่สุด คือ มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา คือ มวนวน ไรแดง ลูกปลานิล และลูกปลาไน มีค่าเท่ากับ 2, 6, 64 และ 110 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และยัง

กล่าวว่า สารสกัดหนอนตายหยากสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูบางชนิดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะมวนวน ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติของลูกปลานานาดเล็ก โดยจะมีความปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมีกำจัด

2.7 น้ำสกัดชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คือ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมัก เศษพืชหรือสัตว์จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ การหมักมี 2 แบบ คือ หมักแบบต้องการออกซิเจน (หมักแบบเปิดฝา) และหมักแบบไม่ต้องการออกซิเจน (หมักแบบปิดฝา) สารละลายเข้มข้นอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มกรณีที่ใช้กากน้ำตาลเป็นตัวหมัก หรือมีสีน้ำตาลอ่อนเมื่อใช้น้ำตาลชนิดอื่นเป็นตัวหมัก ซึ่งถ้าไม่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้ว จะพบสารประกอบพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฮอริโมน เอนไซม์ ในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ (พืชหรือสัตว์)

จุลินทรีย์ที่พบในน้ำสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มีทั้งที่ต้องการออกซิเจนและไม่ต้องการออกซิเจน มักเป็นกลุ่มแบคทีเรีย คือ *Bacillus* spp., *Lactobacillus* spp., *Streptococcus* spp. นอกจากนี้อาจพบเชื้อรา ได้แก่ *Aspergillus niger*., *Penicillium* spp. และ *Rhizopus* spp. และยีสต์ ได้แก่ *Canida* spp. (กรมวิชาการเกษตร, 2550)

2.7.1 ประเภทน้ำสกัดชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพหมักได้จากเศษพืชและสัตว์ ดังนั้น จึงสามารถแบ่งประเภทน้ำสกัดชีวภาพตามวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตได้ 2 ประเภท คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2550)

2.7.1.1 น้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช

1) ผลิตจากผักและเศษพืช การทำน้ำสกัดชีวภาพโดยการหมักเศษพืชสดในภาชนะที่มีฝาปิดปากกว้าง นำเศษผักมาผสมกับน้ำตาล ถ้าพืชผักมีขนาดใหญ่ให้สับเป็นชิ้นเล็ก ๆ จัดเรียงผักเป็นชั้น ๆ โรยน้ำตาลทับสลับกันกับพืชผัก อัตราส่วนของน้ำตาลต่อเศษผักเท่ากับ 1 : 3 หมักในสภาพไม่มีอากาศโดยการอัดผักใส่ภาชนะให้แน่น เมื่อบรรจุผักลงภาชนะเรียบร้อยแล้วปิดฝาภาชนะ นำไปตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม ปล่อยให้หมักต่อไปประมาณ 3 – 7 วัน จะเกิดของเหลวขึ้น

สีน้ำตาล มีกลิ่นหอมของสิ่งหมักเกิดขึ้น ของเหลวนี้เป็นน้ำสกัดจากเซลล์พืชผักประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฮอริโมน เอ็นไซม์ และอื่น ๆ

2) ผลิตจากขยะเปียก โดยการนำขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผักผลไม้ จำนวน 1 กิโลกรัม มาใส่ลงในถังหมัก แล้วเอาปุ๋ยจุลินทรีย์โรยลงไป 1 กำมือ หรือประมาณเศษ 1 ส่วน 20 ของปริมาตรขยะ แล้วปิดฝาให้เรียบร้อย ภายในเวลา 10 – 14 วัน จะเกิดการย่อยสลายของขยะเปียก บางส่วนกลายเป็นน้ำ น้ำที่ละลายจากขยะเปียกสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย โดยนำไปเจือจางโดยการผสมด้วยอัตราส่วนน้ำปุ๋ย 1 ส่วนต่อน้ำธรรมดา 100 – 1,000 ส่วน

2.7.1.2 น้ำสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว์ ปุ๋ยปลาเป็นน้ำสกัดชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายเศษอวัยวะปลา ได้แก่ หัวปลา ก้างปลา หางปลา ฟันปลา และเลือด ผ่านกระบวนการหมักเอ็นไซม์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลังจากหมักจนได้ที่แล้วจะได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง และแมงกานีส นอกจากนี้ปุ๋ยปลายังประกอบด้วยโปรตีนและกรดอะมิโน ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนในตัวปลา แต่จากคำบอกเล่าของเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยปลา พบว่า ปุ๋ยปลาจะไปช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เช่น ดอกไม้ให้สีสดขึ้น ผลไม้มีคุณภาพดีขึ้น และช่วยเร่งการแตกยอดและออกดอกใหม่ได้อีกด้วย

2.7.2 คุณลักษณะดีเด่นของน้ำสกัดชีวภาพ (กรมวิชาการเกษตร, 2550)

2.7.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของน้ำสกัดชีวภาพ

1) น้ำสกัดชีวภาพมีคุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้

(1) มีค่า pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) อยู่ในช่วง 3.5 – 5.6 ปฏิกริยาเป็นกรดถึงกรดจัด ซึ่ง pH ที่เหมาะสมกับพืชควรอยู่ในช่วง 6 – 7

(2) ความเข้มข้นของสารละลายสูง โดยค่าของการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; E.C.) อยู่ระหว่าง 2 – 12 Desicemen/Meter

(3) ความสมบูรณ์ของการหมัก พิจารณาจากค่า C/N Ratio มีค่าระหว่าง 1/2 – 70/1 ซึ่งถ้า C/N Ratio สูงเมื่อนำไปฉีดพ่นบนต้นพืชอาจแสดงอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุไนโตรเจนได้

2) ปริมาณธาตุอาหาร

(1) ไนโตรเจน (ร้อยละ Total N) ถ้าใช้พืชหมักพบไนโตรเจนร้อยละ 0.03 – 1.66 แต่ถ้าใช้ปลาหมักจะพบประมาณร้อยละ 1.06 – 1.70

(2) ฟอสฟอรัส (ร้อยละ Total P₂O₅) ในน้ำหมักจากพืชจะมีตั้งแต่ไม่พบเลยจนถึงร้อยละ 0.4 แต่ในน้ำหมักจากปลาพบร้อยละ 0.18 – 1.14

(3) โปแตสเซียมที่ละลายน้ำได้ (ร้อยละ Water Soluble K₂O) ในน้ำหมักพืชพบร้อยละ 0.05 – 3.53 และในน้ำหมักจากปลาพบร้อยละ 1.00 – 2.39

(4) แคลเซียม ในน้ำหมักจากพืชพบร้อยละ 0.05 – 0.49 และในน้ำหมักจากปลาพบร้อยละ 0.29 – 1.00

(5) แมกนีเซียมและซัลเฟอร์ ในน้ำหมักจากพืชและปลาพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 0.10 – 0.37

(6) เหล็ก ในน้ำหมักจากพืชพบ 30 – 350 ppm. และน้ำหมักจากปลาพบ 500 – 1,700 ppm

(7) คลอไรด์ น้ำหมักจากพืชและปลาที่มีปริมาณเกลือคลอไรด์สูง 2,000 – 11,000 ppm

(8) ธาตุอาหารเสริมอื่น ๆ ได้แก่ แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน และโมลิบดีนัม น้ำหมักทั้งจากพืชและปลาพบในปริมาณน้อย มีค่าตั้งแต่ตรวจไม่พบเลย ถึง 130 ppm

3) ปริมาณกรดอะมิโน

ผลวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน้ำสกัดชีวภาพ 100 กรัม ปรากฏดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ผลวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน้ำสกัดชีวภาพ 100 กรัม

กรดอะมิโน	มิลลิกรัม /100 กรัม
กรดแอสปาร์ติก	346.06
ทรีโอนีน	26.34
ซีรีน	39.30
กรดกลูตามิค	127.45
โปรลีน	1.26
ไกลซีน	13.24
อะลานีน	91.69
ซีสตีน	17.88
วาลีน	55.26
เมทไทโอนีน	9.37
ไอโซลิวซีน	26.26
ลิวซีน	34.30
ไทโรซีน	22.14
ฟีนิลอะลานีน	4.44
ฮีสตีดีน	16.28
ไลซีน	30.20
อาร์จินีน	18.76
ทริปโตเฟน	6.22

แหล่งที่มา: กรมวิชาการเกษตร, 2550.

4) ปริมาณฮอร์โมนพืช ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Auxin (Indole Acetic Acid: IAA) กลุ่ม Gibberellic Acid: (GA_3) และกลุ่ม Cytokinins (Zeatin และ Kinetin) มีผลดังนี้คือ

(1) IAA ตรวจพบทั้งในน้ำหมักจากพืชและสัตว์ แต่พบในปริมาณน้อย มีค่าในช่วงตั้งแต่น้อยมากจนไม่สามารถวัดได้ ถึง 2.37 ppm

(2) GA₃ ตรวจพบในน้ำหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 18 – 140 ppm แต่ไม่พบ GA₃ ในน้ำหมักจากปลา

(3) Zeatin ตรวจพบในน้ำหมักจากพืชบางตัวอย่างในปริมาณน้อย 1 – 20 ppm. และพบในน้ำหมักจากปลาที่ใส่น้ำมะพร้าว 2 – 4 ppm.

(4) Kinetin ตรวจพบในน้ำหมักจากพืชบางชนิดในปริมาณ 1 – 14 ppm แต่ไม่พบในน้ำหมักจากปลา

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ จุลินทรีย์ที่ทำให้ย่อยสลาย กระบวนการย่อยสลายที่สมบูรณ์ไม่เน่าเสีย ความเข้มข้นของสารละลาย และความเป็นกรดเป็นด่าง

2.7.2.2 คุณสมบัติของน้ำสกัดชีวภาพในด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การหมักพืชหรือสัตว์ในกระบวนการหมักจะมีก๊าซมีเทน (CH₄) เกิดขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียจะเปลี่ยนก๊าซมีเทน(CH₄) ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์เมื่อถูกออกซิเจนในอากาศ ทำให้กลายเป็นเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีกลิ่นหอมหรือเหม็นเฉพาะตัว ถ้ามีกลิ่นหอมก็เป็นสารดึงดูดแมลง ถ้ามีกลิ่นเหม็นก็จะเป็นสารไล่แมลง จากการวิเคราะห์น้ำสกัดชีวภาพของสำนักวิจัยและพัฒนาการผลิตสารธรรมชาติ กรมวิชาการเกษตร ปรากฏดังนี้

1) น้ำสกัดชีวภาพที่หมักจากผลไม้ ผักสด หรือสมุนไพร จะมีสารพวก Polyphenol ได้แก่ 1, 2 Benzenediol หรือ 1, 3 Benzenediol พวก Dimethoxyphenol และ Benzoic Acid Derivatives สารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นกรด เช่น 1, 3 Benzenediol (Resorcinol) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยื่อเมือก ทางสัตวแพทย์เคยใช้เป็น Antiseptic ดังนั้น สารพวกนี้อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังของแมลงได้ นอกจากนี้ยังพบสารพวก Ethylester ของพวกกรดไขมัน เช่น Ethyl Palmitate หรือ Ethyl Linoleate ในสารละลายบางตัว พบ Alcohol ได้แก่ Benzene Ethanol

2) น้ำสกัดจากหอย + ไข่ดาว พบสารพวก Poly Phenol และ Ethyl Ester ของกรดไขมันเช่นเดียวกับ Ethyl Ester ที่เกิดจาก Alcohol ชนิด Ethyl Alcohol ที่สกัดจากการหมักย่อยสารของพืชแล้ว Alcohol นั้นก็ทำปฏิกิริยากับกรดไขมันที่มีในพืชที่เป็น Ethyl Ester คุณสมบัติของ Ester พวกนี้มีคุณสมบัติเป็นสารไล่แมลงและสารล่อแมลงได้

แต่ถ้าเกษตรกรต้องการใช้พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ควรใช้น้ำธรรมชาติหรือน้ำอุ่น (ในกรณีของพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยปนอยู่ด้วย) ในอัตราส่วนพืช 1 กิโลกรัม แช่น้ำ 20 ลิตร คนเป็นครั้งคราว ทิ้งไว้ 1 คืน ไม่ควรเกิน 2 คืน นำเอาสารละลายที่

ได้มาผสมน้ำอีกเท่าตัว แล้วฉีดพ่นบนต้นพืช จะให้ผลดีกว่าการนำมาหมักผสมกันหลาย ๆ ชนิด กับกากน้ำตาล และการฉีดพ่นไม่ต้องฉีดพ่นรวมกับน้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ควรฉีดพ่นเมื่อต้องการนำมาใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเท่านั้น พืชที่สามารถนำมาใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ สะเดา (ใช้ส่วนของเมล็ด) ตะไคร้หอม (ใช้ส่วนของใบ) หนอนตายหยาก (ใช้ส่วนราก) ว่านน้ำ (ใช้ส่วนเหง้า) ช่า (ใช้ส่วนแงง) และสาบเสือ (ใช้ส่วนใบ) เป็นต้น

2.7.3 คำแนะนำวิธีการใช้

2.7.3.1 การทำน้ำสกัดชีวภาพ

- 1) ใช้เศษพืช ผัก ผลไม้ หรือเศษอาหารที่ยังไม่บูดเน่า นำมาล้างหรือบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด เช่น ถังพลาสติก หรือโถง
- 2) ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงหรือขาวลงไป 1 ใน 3 ของน้ำหนักผัก (1 : 3) ในอัตราส่วนนี้ถ้ามีน้ำสกัดชีวภาพอยู่แล้วให้ใส่กากน้ำตาลน้อยลง
- 3) มีช่องหนักวางทับผัก แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 5 – 7 วัน
- 4) จะมีช่องเหลวสีน้ำตาลไหลออกมา คือ น้ำสกัดชีวภาพ กรอกใส่ขวดปิดฝาให้สนิทพร้อมที่จะนำมาใช้

2.7.3.2 ข้อควรระวังในการทำน้ำสกัดชีวภาพ

- 1) ในระหว่างการหมักห้ามปิดฝาภาชนะที่ใช้หมักโดยสนิท เพราะจะทำให้ระเบิดได้ เนื่องจากระหว่างการหมักเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น
- 2) หากมีการใช้น้ำประปาในการหมักต้องต้มให้สุกหรือตากแดดเพื่อไล่คลอรีน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก
- 3) พืชบางชนิดไม่ควรใช้ในการหมัก เช่น เปลือกส้ม เพราะมีน้ำมันที่ผิวเปลือกเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในสภาพปลอดอากาศ
- 4) การทำน้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพควรหมักให้ได้ที่ เนื่องจากเคยพบปัญหาการเกิดเชื้อราที่ใบทุเรียน เพราะน้ำตาลที่เหลืออยู่จุลินทรีย์ใช้ไม่หมด

2.7.3.3 ข้อควรระวังในการใช้น้ำสกัดชีวภาพ

- 1) การใช้น้ำสกัดชีวภาพกับพืชบางชนิด เช่น กล้วยไม้ อาจทำให้วัสดุที่ใช้ปลูก เช่น กาบมะพร้าวผุเร็วก่อนเวลาอันสมควร

2) การใช้น้ำสกัดชีวภาพกับพืชนั้น ในดินควรมีอินทรีย์วัตถุอยู่ เช่น มีการใส่ปุ๋ยหมัก และเศษพืชแห้งคลุมดินไว้ ซึ่งทำให้การใช้ประโยชน์จากน้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพได้ดี

3) น้ำสกัดชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพที่มีธาตุไนโตรเจนสูงควรระวังการใช้ เพราะถ้าใช้มากอาจทำให้ไม่ออกดอกออกผลได้

2.7.4 การประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี

2.7.4.1 ประโยชน์ของน้ำสกัดชีวภาพ

1) ใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง น้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ และจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนนำไปใช้ประโยชน์จึงต้องทำให้เจือจางมาก ๆ อัตราส่วนน้ำสกัดต่อน้ำสะอาด คือ 1 : 500 หรือ 1 : 1,000 การใช้เป็นน้ำสกัดจะต้องมีความระมัดระวังมาก ถ้าเข้มข้นมากไปพืชจะชะงักการเจริญเติบโต ใบจะมีสีเหลือง ถ้าใช้ในอัตราที่พอเหมาะพืชจะแสดงสภาพเขียวสด ใบเป็นมัน ต้นพืชที่ชะงักการเจริญเติบโตจะขยายตัวแตกตาเป็นใบภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้น การใช้จึงควรใช้อัตราเจือจางมากมาเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถใส่ให้แก่ต้นไม้ประมาณ 3 – 7 วันต่อครั้ง และเมื่อพืชเจริญงอกงามดีในเวลาต่อมาจะใช้เดือนละครั้งก็ได้

2) ใช้ป้องกันกำจัดแมลงและโรค โดยการผสมน้ำสกัดชีวภาพในอัตราเจือจางฉีดพ่นโดยเฉพาะเปลี้ยแป้ง

3) ใช้ประโยชน์ในการกำจัดน้ำเสียและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำน้ำสกัดชีวภาพไปให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น บ่อน้ำ หรือสระน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุย่อยสลายบูดเน่า ก็สามารถใส่น้ำสกัดชีวภาพลงในแหล่งน้ำดังกล่าว โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพในอัตราส่วน 1 : 100, 1 : 250 หรือ 1 : 500 โดยคิดจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำ 1,000 ส่วน เติมน้ำสกัดชีวภาพ 1 ส่วน ส่วนระยะเวลาการย่อยสลายใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ขึ้นไป

4) ใช้กับสัตว์เลี้ยง (ไก่และสุกร) โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพจำนวน 20 ลิตร นำไปใช้เลี้ยงไก่หรือสุกร เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อก่อโรค โดยวิธีดังกล่าวจะมีสรรพคุณทำให้สัตว์แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรค และที่สำคัญพื้นคอกไก่ไม่มีกลิ่นแอมโมเนีย ส่งผลให้ไก่ไม่เป็นโรค

ดังนั้น น้ำสกัดชีวภาพ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ขยะจากตลาด จาก

ครัวเรือน เศษวัสดุจากโรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานปลากระป๋อง เศษปลาจากตลาด หอยเชอรี่ นำมาหมัก จากการหมักมีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง จุลธาตุ กรดอะมิโน และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักซึ่งมีสูตรมาตรฐานชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการหาแหล่งที่เหมาะสม และจะต้องเข้าใจในการจัดการในด้านพื้นฐานหลัก คือ ธาตุหลัก N - P - K กับการจัดการธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ รวมทั้งสมดุลของคุณสมบัติดินทั้งกายภาพและเคมีอย่างเหมาะสม การผลิตใช้เองเกิดประโยชน์ในด้านลดต้นทุน แต่ต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตในระยะยาว .

2.7.5 ผลการวิเคราะห์น้ำสกัดชีวภาพ

การตรวจวิเคราะห์ด้วยกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ของน้ำสกัดชีวภาพ มีรายละเอียดคือ (กรมวิชาการเกษตร, 2550)

2.7.5.1 น้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ถ้าน้ำมีสภาพเป็นกรด และมีก๊าซออกซิเจนในการหมัก โดยการเปิดฝาเวลาหมัก ในสารละลายจะมีแบคทีเรียชนิด Methanotrophic ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เปลี่ยนก๊าซมีเทนให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ (Methanol) และแอลกอฮอล์จะถูกออกซิเจนในอากาศทำให้ออกกลายเป็นเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ ซึ่งสารพวกเอสเทอร์จะมีกลิ่นหอมและกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว ใช้เป็นสารดึงดูดแมลงและสารไล่แมลงได้

2.7.5.2 กลูโคสในพืชที่ใช้หมัก ถ้าในขณะหมักมีแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram Positive) คือ *Eubacterium* spp., *Sarcina ventriculi* และมีออกซิเจน คือ เปิดฝาเวลาหมัก พร้อมกับในสารละลายมี Enzyme 3 ตัว ซึ่งมีอยู่ในพืชเอง คือ Pyruvate Dehydrogenase, Phosphotran Sacetylase, Acetate Kinase ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายกลูโคส ให้กลายเป็นสารไพรูเวทและจะถูกย่อยสลายต่อไป จนสุดท้ายได้สาร Acetic Acid และ Acetate เมื่ออนุมูล Acetate มารวมตัวกับ Minor Elements เช่น Ca, Mg จะได้เป็น Calcium Acetate และ Magnesium Acetate ถ้าวางรวมตัวกับพวก Major Elements จะได้เป็น $\text{NaOOCCH}_3\text{C}$ (Sodium Acetate) หรือ KOOCH_3C (Potassium Acetate) ซึ่งพืชพร้อมจะดูดเอาไปใช้เป็นอาหารได้เลย

2.7.5.3 ถ้ามักแบบปิดฝาไม่มีออกซิเจน เอทานอล (Ethanol) ซึ่งเป็นสาร Product สุดท้ายเมื่อเจออากาศจะได้เป็นสารพวกเอสเทอร์ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นเช่นกัน ใช้เป็นสารดึงดูดแมลงและเป็นสารไล่แมลงได้

2.7.5.4 แบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative) ชื่อ *Eubacterium* spp., *Zymomonas mobilis* จะได้สารเอทานอล (Ethanol) แล้วเปลี่ยนเป็นเอสเทอร์เช่นกัน

2.7.5.5 กลูโคส เป็นสารที่มีอยู่ในพืชทุกชนิดในรูปน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ถูกละสมเอาไว้ใช้ เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปอื่น ๆ ที่พร้อมจะนำไปใช้ เช่น พลังงานอาหารต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเป็น Acetic Acid, Lactic Acid เมื่ออยู่ในสารละลายถ้ามี Major Elements, Minor Elements จะเปลี่ยนรูปเป็นสารอาหารเช่นกัน ซึ่งพืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

2.8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลงวัน

เมื่อกล่าวถึงแมลงวันส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้ว จะหมายถึงแมลงวันบ้าน (Housefly, *Musca domestica*) แมลงวันเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับคน ฟาร์มปศุสัตว์ สิ่งปฏิกูล และกองขยะทั่วไป โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ แหล่งกำเนิดของแมลงวันไม่มีผู้ใดทราบว่าเป็นในภูมิภาคใดของโลกมาก่อน แต่จากการศึกษาด้านชีววิทยาและการกระจายของแมลงวันเข้าใจว่าระยะแรก ๆ นั้น มีพบติดตามไปกับมนุษย์ในภูมิภาคเขตร้อนแถบแอฟริกาตะวันออก แมลงวันมีความใกล้ชิดกับคนมาก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไชนันโทรปีคฟลาย (Synanthropic Fly) ซึ่งแปลว่า อยู่ร่วมกับมนุษย์ มีแมลงวันหลายชนิดที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่อย่างไรก็ตามพบว่าแมลงวันบ้าน เป็นแมลงที่มีความชุกชุมและกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของโลก (กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2539: 54 – 64)

2.8.1 อนุกรมวิธานและการกระจาย

แมลงวันจัดอยู่ในชั้นอินเซคต้า (Class Insecta) อันดับดิฟเทอริรา (Order Diptera) ซึ่งเป็นแมลงประเภทมีสองปีก แต่แบ่งแยกเป็นอันดับรองไซคลอราฟา (Suborder Cyclorhapha) ที่สำคัญมี 4 วงศ์ (Families) ตามภาพที่ 2.1

Class Insecta

Order Diptera

Suborder Cyclorrhapha

Family	Family	Family	Family
Muscidae	Glossinidae	Calliphoridae	Sarcophagidae
เช่น แมลงวันบ้าน	เช่น แมลงวันนำโรค เหงาหลับ	เช่น แมลงวัน หัวเขียว	เช่น แมลงวันหลังลาย

ภาพที่ 2.1 อนุกรมวิธานและการกระจายของแมลงวัน

แหล่งที่มา: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2539: 54.

แมลงวันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน ได้แก่ แมลงวันในวงศ์ (Family) มุสซิดี (Muscidae) และวงศ์คัลลิฟอริดี (Calliphoridae) ส่วนแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญในทวีปแอฟริกาอยู่ในวงศ์กลอสซินีดี (Glossinidae) ได้แก่ แมลงวันสกุลกลอสไซนา (*Glossina* spp.) ซึ่งเป็นพาหะนำโรคเหงาหลับ (African Sleeping Sickness) ซึ่งเกิดจากเชื้อโปรโตซัว สกุล *Trypanosoma* spp. บางชนิด

สำหรับแมลงวันในวงศ์ Muscidae นั้นมีแมลงวันสกุล (Genus) ที่สำคัญ ได้แก่ มุสก้า (*Musca*) สโตม็อกซีส (*Stomoxys*) มุสซึนา (*Muscina*) และแฟนเนีย (*Fannia*) สำหรับมุสก้า *Musca* นั้นมีประมาณ 26 ชนิด (Species) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่อิสระไม่เข้ามาสัมพันธ์กับคนเท่าใดนัก มีกระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะของแมลงวันชนิดนี้ที่สำคัญมีขนาดปานกลาง ส่วนหลังมีสีดำหรือเทาเป็นท่อนยาว

2.8.1.1 ชนิดของแมลงวันบ้าน (*Musca domestica*)

ได้มีการศึกษาพบว่า มีประมาณ 4 ชนิดย่อย ได้แก่

1) *Musca domestica domestica* มีกระจายทั่วโลกจากเขตร้อนจนถึงเขตหนาว (Subartic) แมลงวันบ้านที่พบนอกเขตทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้เกือบทั้งหมด

โดยทั่วไปจึงถือว่าแมลงวันที่พบในทวีปอื่นเป็นพวก *M.d. domestica* ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง *M.d. vicina* และ *M.d. nebulosa* ด้วย

2) *Musca domestica vicina* พบทั่วไปเช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเทศเขตร้อนและเขตติดต่อกับเขตร้อน เช่น ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ และอเมริกากลาง ออสเตรเลีย และแปซิฟิก

3) *Musca domestica nebulosa* พบในเขตร้อนของทวีปเอเชียเท่านั้น

4) *Musca domestica curviforceps* พบเฉพาะในทวีปแอฟริกาเท่านั้น มีพบชุกชุมมากแถบประเทศติดทะเลทรายสะฮารา (Sahara) ตอนใต้

การแยกวินิจฉัยแมลงวัน 4 ชนิดย่อยนี้ อาศัยแยกโดยขนาดของตา (Compound Eyes) โดยวัดความกว้างของหน้าผากระหว่างตา เทียบกับความกว้างของหัว (Frons Ratio) ของตัวผู้ และโดยการตรวจสอบจุดที่ส่วนท้อง แมลงวันดังกล่าวข้างต้นมีนิสัยส่วนใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนตามบ้านเรือน ร้านค้า สถานประกอบการต่าง ๆ ดังนั้น จึงเรียกเป็นแมลงวันบ้าน (House Fly หรือ Domestic Fly)

มีแมลงวันสกุล *Musca* ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ *Musca sorbens* มีนิสัยชอบอยู่นอกอาคารสถานบ้านเรือนที่พบอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาและเอเชีย นอกจากนั้นยังพบชุกชุมทางตอนใต้ของทวีปยุโรปโดยมีความสำคัญทางการแพทย์เนื่องจากนิสัยชอบขยายพันธุ์หรือวางไข่ตามมูลมนุษย์และสัตว์เลี้ยง แมลงวันชนิดนี้ชอบบินมาเกาะตามแผล ตามผิวหนังของคน รวมทั้งตาและส่วนที่เป็นแผลเรื้อรังของคนและสัตว์ แมลงวัน *Musca sorbens* นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ *Musca domestica* มาก แต่สามารถแยกชนิดได้โดยดูที่ท่อนด่างกว้างมี 2 ท่อนบนด้านหลังของส่วนอก แต่ *M. domestica* จะมีท่อนดำ 4 ท่อน ที่บริเวณหลัง

2.8.2 วงจรชีวิต

2.8.2.1 ไข่ (Eggs) แมลงวันจะออกไข่มีลักษณะเรียวยาวคล้ายผลกล้วยยาวประมาณ 1 – 1.2 มิลลิเมตร มีสีขาวขุ่นหรือสีครีม แมลงวันจะวางไข่กระจายบนสิ่งขับถ่ายมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลที่มีความชื้นสูง หากความชื้นต่ำกว่าร้อยละ 90 จะมีอัตราตายสูง ไข่จะเจริญพัฒนาอยู่บนสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นจนกระทั่งฟักเป็นตัวอ่อน ระยะเวลาไข่เจริญเป็นตัวนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ ขนาดอุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ไข่จะไม่เจริญในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 13 องศาเซลเซียส อัตราการฟักเป็นตัวอ่อน (Hatching) ของไข่จะสูงในอุณหภูมิ

ระหว่าง 15 – 40 องศาเซลเซียส แต่ไข่จะฝ่อหรือหยุดเจริญในอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส หรือในอุณหภูมิที่สูงกว่า 42 เซลเซียส ในสภาพดังกล่าวไข่จะไม่ฟักเป็นตัวอ่อน

2.8.2.2 ตัวหนอน (Larvae) แมลงวันส่วนใหญ่จะมีระยะตัวอ่อนหรือที่เรียกว่าตัวหนอนแมลงวัน มี 3 ระยะ (Stage) คือ ระยะ 1, 2 และ 3 การเปลี่ยนระยะแต่ละครั้งจะมีการลอกคราบ (Moult) ระยะที่ 1 มีขนาดความยาวประมาณ 1 – 3 มิลลิเมตร ระยะที่ 2 ยาวประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร และระยะที่ 3 ยาวประมาณ 5 – 13 มิลลิเมตร ตัวหนอนมีลักษณะทรงกลม ยาว คล้ายเม็ดข้าวสาร หัวค่อนข้างแบน ส่วนท้ายจะกลมไม่มีระยางค์ (Appendages) ตัวหนอนระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 จะมีลำตัวค่อนข้างใส ก่อนจะเข้าดักแด้ (Pupation) จะมีสีขาวหรือสีเหลืองเล็กน้อย ตัวหนอนระยะท้ายของระยะที่ 3 อาจเรียกตัวอ่อนดักแด้ (Prepupae) ตัวหนอนแมลงวันจะมีปากที่มีอวัยวะลักษณะคล้ายตะขอที่แข็งแรง ทำหน้าที่ในการกินอาหารและเคลื่อนย้ายตัว

ตัวหนอนระยะที่ 1, 2 และต้นระยะที่ 3 เป็นระยะที่ตัวหนอนกินอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ แบคทีเรีย หรือยีสต์ หรือเศษสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีโปรตีน (Amino Acid หรือกรดอะมิโน) วิตามิน (B Groups) และสารพวกสเตอรอล ระยะที่กินอาหารนี้จะสัมพันธ์กับกลิ่นเหม็นของอาหาร อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 35 องศาเซลเซียส และต้องการความชื้นสูงมาก โดยเฉพาะระยะที่ 1 ต้องการความชื้นสูงกว่าร้อยละ 97 ตัวหนอนเหล่านี้จะไม่ชอบแสง และโดยปกติตัวหนอนเหล่านี้จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน

ตัวหนอนระยะที่ 3 ระยะหลัง ๆ จะหยุดกินอาหารและเปลี่ยนเป็นระยะตัวอ่อนดักแด้ (Prepupa) พฤติกรรมต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป ยกเว้นตัวหนอนเหล่านี้ยังคงไม่ชอบแสงและระยะนี้ไม่ชอบกลิ่นเหม็น จะชอบอุณหภูมิต่ำประมาณ 15 – 20 องศาเซลเซียส และต้องการความชื้นค่อนข้างต่ำ ระยะนี้จะเคลื่อนตัวเร็วมาก มักจะพยายามเคลื่อนย้ายหาที่เย็นกว่า และต้องการความแห้ง เช่น ผิวน้ำหรือพื้นผิวของสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตว์ที่แห้ง หรืออาจเคลื่อนตัวไปฝังตัวตามดินรอบ ๆ กองขยะ หรือสิ่งปฏิกูล หลังจากนั้นจะเข้าเป็นระยะดักแด้ ส่วนใหญ่จะพบอยู่รวมกันจึงเห็นดักแด้อยู่เป็นกลุ่มประมาณ 100 – 1,000 ตัว

2.8.2.3 ดักแด้ (Pupa) เมื่อตัวหนอนตอนปลายระยะที่ 3 พร้อมทั้งจะเป็นดักแด้ ผิวน้ำจะเริ่มแข็งและจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรูปคล้ายถังหมักเบียร์ ผนังระยะแรกจะมีสีขาวยหรือเหลืองอ่อนใน 1 – 2 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน และกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบเป็นสีดำ ผนังจะแข็งตัวมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงใช้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ในเปลือกหุ้มจะมีตัวหนอนระยะที่ซึ่งมีขนาดลดลง หลังจากนั้นก็จะเจริญพัฒนาเป็นดักแด้

2.8.2.4 ตัวเต็มวัยหรือแมลงวัน (Adult)

1) ระยะเวลาเริ่มออกจากดักแด้ (Emerge from Puparium) เมื่อดักแด้ในผนังห้องหุ้มเจริญเติบโต จะเจาะทะลุผนังห้องหุ้มส่วนหน้าออกอย่างรวดเร็ว แมลงวันตัวเต็มวัยระยะแรก ที่ออกมาจากผนัง จะมีลำตัวอ่อนนิ่ม สีเทาอ่อน โดยจะอาศัยงูลมส่วนหน้าช่วยผลักดันตัวให้ออกมาจากสิ่งทับถม เช่น ดิน หรือสิ่งปฏิกูลที่ทับอยู่ และเมื่อออกมาสู่บรรยากาศภายนอกของขยะ มันยังบินไม่ได้ แต่จะมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม ต่อจากนั้นจะหาแหล่งเกาะพัก และปีกจะเริ่มขยายออก ผนังห้องหุ้มลำตัวเริ่มแข็งแรงขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีดำหรือเทาเข้ม ระยะที่เกาะพักนี้ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า ก่อนที่จะสามารถบินได้ ดังนั้น สถานที่แมลงวันเกาะพักในครั้งแรกก่อนที่ยังไม่สามารถบินได้ จึงเป็นแหล่งที่มีความสำคัญในการควบคุมแมลงวันที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ที่ยังบินไม่ได้จะมีนิสัยที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ไม่ชอบแสงและพยายามเคลื่อนตัวขึ้นที่สูง ดังนั้น เมื่อเกิดใหม่ ๆ จะพยายามเข้าหาที่มีมืดเสมอ และการเกาะพัก มักจะเกาะพักโดยเอาส่วนหัวลง แมลงวันจะเริ่มกินอาหารเมื่อปีกขยายออกแล้ว จากนั้นจะสามารถบินได้ ซึ่งใช้ระยะเวลา ระหว่าง 2 – 24 ชั่วโมง หลังจากออกจากผนังดักแด้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

2) การผสมพันธุ์ (Mating) ในสภาพที่อุณหภูมิเหมาะสมแมลงวันตัวผู้จะผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 วัน (หรือมากกว่า 18 ชั่วโมง) แมลงวันตัวเมียจะสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุมากกว่า 1 วัน (ประมาณ 30 ชั่วโมง) สิ่งกระตุ้นให้แมลงวันผสมพันธุ์ ได้แก่ การมองเห็น นอกจากนั้นการกระตุ้นจากฟีโรโมน (Pheromone) ก็มีผลสำคัญ ได้มีการพบฟีโรโมนมัสคาเลียว (Pheromone Muscalure) ซึ่งผลิตจากแมลงวันตัวเมียมีส่วนดึงดูดแมลงวันตัวผู้และตัวเมียมารวมกัน นอกจากนั้นยังมีผู้พบฮอร์โมนจากตัวผู้ช่วยทำให้แมลงวันตัวผู้และตัวเมียมารวมตัวกัน แต่พบว่าไม่ได้ผลกับการผสมพันธุ์มากนัก ตามปกติตัวเมียจะผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว เพื่อเพศผู้จะถูกเก็บไว้ใน Spermatheca ของตัวเมีย น้ำเชื้อจะสามารถผสมกับไข่ได้นาน 3 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น


3) การวางไข่ (Oviposition) แมลงวันตัวเมียจะสามารถวางไข่ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ การวางไข่จะเริ่มตั้งแต่ 1.8 วัน ในอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และจะใช้เวลา 9 วัน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปแมลงวันจะไม่วางไข่เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ตัวเมียชอบวางไข่ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ มีกลิ่นของเสียและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นตัวดึงดูดให้แมลงวันมาวางไข่ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย และกลิ่นเหม็นอื่น ๆ

จากสิ่งปฏิภูล แมลงวันจะวางไข่ไว้ใต้พื้นผิวที่มีรุ่มเงาหรือส่วนที่ไม่สัมผัสกับแดด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความแห้งซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตเป็นตัวหนอน

ปกติแมลงวันจะออกไข่ประมาณครั้งละ 120 ฟอง หากไม่มีสิ่งรบกวน แมลงวันตัวหนึ่งจะวางไข่เป็นกลุ่มในที่เดียว และจะพบเสมอว่าแมลงวันจำนวนมากจะเลือกมาวางไข่แหล่งเดียวกัน ในห้องปฏิบัติการ พบว่า แมลงวันตัวเมียสามารถวางไข่เฉลี่ย 10 ครั้ง หรือมากกว่านี้ แต่ในธรรมชาติที่มีสภาพที่เหมาะสมแมลงวันจะวางไข่ได้เพียง 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากแมลงวันในธรรมชาติอายุสั้นกว่าห้องปฏิบัติการมาก

4) อายุขัยของแมลงวัน (Longevity) ได้มีผู้ศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 50 ของแมลงวันที่เกิด จะตายในระยะ 3 – 6 วันแรก และมีจำนวนน้อยมากที่จะมีอายุยืนยาวถึง 8 – 10 วัน ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า แมลงวันมีอายุสั้น แต่จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่า แมลงวันตัวผู้อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 17 วัน ตัวเมียอายุประมาณ 29 วัน (อุณหภูมิตั้งที่ 25 องศาเซลเซียส ที่มีความชื้นร้อยละ 45) ดังนั้น ในการควบคุมแมลงวันเพื่อความสมบูรณ์ของการควบคุม จึงควรถืออายุขัยของแมลงวันเป็นประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ การที่แมลงวันมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นและแมลงวันส่วนใหญ่ตายไปก่อนที่จะมีการวางไข่ขยายพันธุ์ ก็มีผลสำคัญในการดำเนินการควบคุม คาดว่าจะมีแมลงวันจำนวนไม่มากนักที่สามารถวางไข่ได้เกินกว่า 2 – 3 ครั้ง การที่แมลงวันมีอายุขัยสั้นอาจเป็นผลจากเชื้อราบางชนิด เช่น *Entomophthora muscae* นอกจากนั้นยังพบว่า ลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ความชื้น อุณหภูมิ และฤดูกาล ก็มีผลสำคัญทำให้แมลงวันมีอายุขัยสั้นลง

5) ความสามารถในการขยายพันธุ์ (Reproductive Potential) ในประเทศเขตร้อนจำนวนช่วงอายุของแมลงวันอาจมีได้ถึง 30 ช่วงอายุ ได้มีการประเมินการขยายพันธุ์ของแมลงวันโดยประมาณว่าตัวเมียตัวหนึ่งสามารถออกลูกหลานจำนวน 100 – 200 ตัว พบว่าการเพิ่มประชากรของแมลงวันนั้นมีศักยภาพสูงมาก และหากมีสภาพอาหารเหมาะสม โอกาสที่ทำให้เกิดแมลงวันที่สมบูรณ์มากถึง 5,000 – 10,000 ตัว จึงทำให้คาดว่า การเพิ่มและแพร่พันธุ์ประชากรแมลงวันมีความรวดเร็วมาก แม้ว่าแมลงวันเหล่านี้จะมีอายุสั้นและมีอัตราตายในเยาว์วัยสูงก็ตาม หากสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยและสิ่งปฏิภูลที่เป็นอาหารของตัวหนอนอุดมสมบูรณ์ โอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของแมลงวันย่อมมีมากขึ้นด้วย



ภาพที่ 2.2 แสดงวงจรชีวิตแมลงวัน

แหล่งที่มา: สุทธาพันธ์ โปธิ์กำเนิด, 2544: 12.

2.8.3 แหล่งเพาะพันธุ์

แมลงวันสามารถวางไข่ขยายพันธุ์ในแหล่งเพาะพันธุ์ได้หลายชนิด ซึ่งรวมทั้งกองขยะ สิ่งปฏิกูล มูลขยะต่าง ๆ แหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของแมลงวัน มีดังนี้

2.8.3.1 มูลสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของแมลงวันบ้าน สำหรับมูลสัตว์ที่กองกระจัดกระจายนอกบ้านส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ *M. sorbens* มูลสัตว์เหล่านี้จะมีความชื้นและความนุ่มเหมาะสมต่อการวางไข่แพร่พันธุ์ของแมลงวันเหล่านี้ มูลสัตว์พวกโค กระบือ ไก่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีกับแมลงวัน แต่ในบางภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการทำฟาร์มสุกร พบว่า แมลงวันมีความชุกชุมมาก มูลของสุกรจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวันเหล่านี้เช่นกัน

2.8.3.2 กองสิ่งปฏิกูลและของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เศษขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ในการผลิตอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์อย่างดีของแมลงวัน เช่น เปลือกผลไม้ เศษพืชผักผลไม้ต่าง ๆ

2.8.3.3 เศษของเน่าเสีย ซึ่งมีสารอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหารต่าง ๆ กองขยะจากตลาด จากอาคารบ้านเรือน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวัน ทั้งในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งในเขตชนบทด้วย

2.8.4 ฤดูชุกชุม

ปกติความชุกชุมของแมลงวันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหาร ความสามารถในการขยายพันธุ์และสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นที่มีความเหมาะสม อุณหภูมิมีความสำคัญที่ช่วยให้แมลงวันมีการผสมพันธุ์ ระยะการเจริญเติบโตของไข่ การวางไข่ และการออกหาอาหารของตัวเมียเต็มวัย อุณหภูมิของแหล่งเพาะพันธุ์ ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวหนอนและดักแด้เจริญ โดยปกติมูลสัตว์หรือกองขยะสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ อุณหภูมิจะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตัวหนอนและดักแด้

ในประเทศเขตอบอุ่นและหนาว แมลงวันสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดและขยายพันธุ์ได้ในช่วงระยะฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในฤดูหนาวแมลงวันสามารถเก็บตัวในอาคาร มีผู้ศึกษา พบว่าแมลงวันตัวเต็มวัยสามารถจำศีลในฤดูหนาวได้ นอกจากนั้นยังพบว่าระยะก่อนเข้าดักแด้และระยะดักแด้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในมูลสัตว์ที่เย็นและแข็งตัวในฤดูหนาวได้

ในประเทศไทยเราจะพบว่าแมลงวันมีความชุกชุมตลอดปี แต่ที่พบชุกชุมมาก ได้แก่ ในฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่มีผลไม้สุกสุตลามาก เช่น พุเรียน มะม่วง เงาะ ลำไย เป็นต้น แต่ในบางท้องถิ่นหรือบางจังหวัดที่มีฟาร์มปศุสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ จะพบว่าความชุกชุมของแมลงวันมีสูงในต้นฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากฟาร์มต่าง ๆ เหล่านี้มีปริมาณมูลสัตว์มาก ไม่สามารถทำลายหรือนำไปตากทำปุ๋ยได้จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวัน

2.8.5 ชีวิตวิทยาและนิสัยของแมลงวัน

2.8.5.1 การหากิน (Feeding) แมลงวันทั้งตัวเมียและตัวผู้ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีในประเทศเขตร้อน และตัวเมียต้องการโปรตีนเพื่อให้ไข่เจริญเติบโต ไม่ต้องการไขมัน แมลงวัน สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เช่น มูลสัตว์ มูลมนุษย์ หนองของแมลงวันจะมีอวัยวะที่ทำหน้าที่รับกลิ่นแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าใดนัก ส่วนใหญ่แมลงวันจะหาอาหารโดยบินสู่มั่วทั่วไปโดยอาศัยการมองเห็นเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดดำ ๆ และสามารถตอบสนองต่อความชื้นและกลิ่นในระยะใกล้ ๆ ได้ดี

เมื่อแมลงวันสัมผัสกับอาหารมันจะทดสอบโดยใช้ปาก (Proboscis) และที่สำคัญมีอวัยวะที่รับสาร (Chemotactic Receptors) อยู่ที่เท้า อวัยวะส่วนนี้จะมีความไวต่อน้ำตาล ถ้า

อาหารนั้นเป็นของเหลวมันจะดูดขึ้น แต่หากแข็งมันจะทำให้อาหารเป็ยกก่อนโดยปล่อยน้ำลาย ออกจากอุ้งลมและต่อมน้ำลาย โดยอาจจะใช้พื้นที่มีขนาดเล็กที่ปาก (Proboscis) กัดได้ หากมี อาหารที่เป็นกรดอะมิโนหรือพวกโปรตีน สารพวกนี้จะมีส่วนกระตุ้นให้แมลงวันตัวเมียดูดกินอาหาร เพิ่มมากขึ้น

โดยทั่วไปแมลงวันจะชอบอาหารที่มีน้ำตาลและแป้งปนอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากน้ำลาย ของแมลงวันตัวแรก ๆ ที่มาเกาะจะทำให้อาหารเหล่านั้นเป็ยก ทำให้อาหารมีรสหวานที่แมลงวัน ชอบ เพราะส่วนของอาหารเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นน้ำตาล แมลงวันที่หิวจะบินหาอาหารโดยสู่มไป ทัวเมื่อพบอาหารที่มีปริมาณน้อย ๆ มันจะบินหมุนรอบ ๆ เพื่อหาอาหารในแหล่งใกล้ ๆ นั้น ได้มี รายงานว่าแมลงวันสามารถเรียนรู้ถึงการจำแนกกลิ่นและแสงได้

2.8.5.2 การกระจายและการเกาะพักในตอนกลางวัน การกระจายของแมลงวัน ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและนิเวศวิทยาของแมลงวัน ส่วนใหญ่พบอาศัยกระจายอยู่รอบ ๆ อาหารและ แหล่งเพาะพันธุ์ การผสมพันธุ์จะเกิดบริเวณนี้เช่นกัน แมลงวันจะเคลื่อนไหวยวดเร็วในที่ที่มีแสง ได้แก่ ในเวลากลางวัน หรือในที่ที่มีแสงไฟ แต่ในที่มืด แมลงวันจะเกาะพัก หรือเดินไต่ตามแหล่ง เกาะพักอย่างช้า ๆ แมลงวันมีการเคลื่อนไหวยตลอดเวลา อุณหภูมิ ความชื้น ลม และแสง รวมทั้งสี หรือ ลักษณะของพื้นผิว เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้แมลงวันเคลื่อนไหวยวดเร็วตัวกันหรือเกาะพัก โดยทั่วไปแหล่งเกาะพักในตอนกลางวันของแมลงวันจะอยู่ใกล้แหล่งอาหาร ในสภาพอากาศที่มีน้ำ และแหล่งที่ชื้นจะเป็นสิ่งดึงดูดแมลงวันให้มารวมกัน ในบรรดาประเภทอาหารทั่วไปแล้ว นมเป็น อาหารที่แมลงวันชอบมากประเภทหนึ่ง

จากการทดสอบ พบว่า แมลงวันชอบเกาะพักในบริเวณที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 – 45 องศาเซลเซียส (สำหรับแมลงวันเกิดใหม่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิประมาณ 45 – 47 องศาเซลเซียส จะทำให้แมลงวันหยุดการเคลื่อนไหวและอาจถึงตายได้ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส จะทำให้แมลงวันลดการเคลื่อนไหวไปมาก ปฏิกริยาตอบสนองของ แมลงวันต่ออุณหภูมิอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่สภาพพื้นที่และภูมิอากาศ โดยทั่วไปแมลงวันตัว เต็มวัยจะชอบอากาศที่มีความชื้นต่ำ และแมลงวันจะพยายามหลีกเลี่ยงกระแสลม แต่ยังไม่พบว่า ความเร็วกระแสลมขนาดไหนมีผลต่อการดำรงชีวิตและการบินของแมลงวัน

ปฏิกริยาของแมลงวันต่อแสงค่อนข้างสับสน ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นกับปัจจัยในด้านอื่น เช่น ทางกายภาพภูมิอากาศ และสรีรวิทยาของแมลงวัน ดังได้กล่าวแล้วแมลงวันที่เกิดมาใหม่ ๆ จะเคลื่อนตัวขึ้นที่สูงเข้าไปในที่มืด แต่แมลงวันที่มีอายุมากจะไม่ค่อยกลัวแสงเท่าใดนักและอาจจะ ตอบสนองต่อแสงได้ดีอีกด้วย

แมลงวันตอสนองต่อสีแตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ในอาคารบ้านเรือน แมลงวันชอบพื้นผิวค่อนข้างมืด สีดำ หรือสีแดงโทนมืด การตอสนองของแมลงวันต่อหลอดไฟสีต่าง ๆ พบว่า ในสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำ ๆ จะชอบหลอดสีทองหรือสีแดง ทั้งนี้ อุณหภูมิจากหลอดไฟอาจมีส่วนสำคัญ แต่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง (28 องศาเซลเซียส) หลอดสีน้ำเงินหรือสี (Ultra – violet) เป็นสีที่แมลงวันชอบ

นิสัยการเกาะพักของแมลงวัน พบว่า มันชอบเกาะบนพื้นผิวขรุขระมากกว่าพื้นเรียบ โดยเฉพาะพื้นผิว ที่เป็นมุมเป็นเหลี่ยม ในประเทศเขตร้อนจะพบว่าแมลงวันจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปนอกอาคารบ้านเรือน เช่น ตลาด ตามสถานประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หรืออาคารโรงเรือนต่าง ๆ แต่หากนอกอาคารมีความร้อนสูงมันจะเกาะในอาคารหรือที่ร่มเงาที่เย็น ในพื้นที่ที่อากาศเย็นแมลงวันจะอยู่ภายในอาคารเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหรือลมแรง ในเขตชนบทแมลงวันจะอยู่กระจัดกระจายตามร่มเงาร่มไม้หรือเกาะตามตัวสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร และตามคอกสัตว์เหล่านี้

2.8.5.3 แหล่งเกาะพักเวลากลางคืน ส่วนใหญ่จะเกาะพักในแหล่งที่ใกล้กับแหล่งที่หาอาหารในตอนกลางวัน เช่น เกาะพักตามใบไม้ ต้นไม้ หรือตามเส้นเชือกระโยงระไยตามอาคารบ้านเรือน ตลาด หรือโรงเรือนคอกสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งรั้วคอกสัตว์ และตามมุมเหลี่ยมของเสาหรือไม้ หรือวัตถุขนาดเล็ก ๆ โดยปกติจะพบเกาะในที่สูงกว่าพื้นมากกว่า 2 เมตร และเป็นที่ไม่ค่อยมีลมมารบกวน ตามอาคารบ้านเรือน หรือตลาดจะพบว่าแมลงวันจำนวนมากเกาะตามเส้นเชือกสายไฟ หรือวัตถุเล็ก ๆ ที่ห้อยแขวนจากหลังคา หรือผูกเป็นราวต่าง ๆ ตามอาคารเหล่านี้ เราอาจสังเกตแหล่งเกาะพักของแมลงวันได้โดยตรวจสอบดำ ๆ ของสิ่งขับถ่ายของแมลงวันที่ติดตามวัสดุเหล่านั้น แหล่งเกาะพักเหล่านี้นับว่ามีความสำคัญในการกำหนดวิธีการในการควบคุมแมลงวันตัวเต็มวัย การให้กาหรือสารเคมีชุบเชือกแขวนไว้หรือผูกชิงไว้อาจเป็นมาตรการที่นำไปใช้ได้บางพื้นที่ นอกจากนั้นการพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างตามแหล่งเกาะพักเหล่านี้อาจมีความจำเป็นในกรณีที่มีการระบาดของแมลงวัน

2.8.5.4 การเคลื่อนกระจาย (Dispersion) แมลงวันเป็นแมลงที่สามารถบินได้คล่องตัวมาก โดยสามารถบินได้อย่างน้อย 6 – 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่โดยธรรมชาติแล้วแมลงวันจะไม่ค่อยเคลื่อนย้าย และจะไม่ค่อยบินระยะทางไกล แต่จะบินอยู่รอบ ๆ แหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหาร หากบินไปพบแหล่งอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งเกาะพักจะอาศัยอยู่บริเวณนั้น โดยปกติจะอยู่ในรัศมี 100 – 500 เมตร จากแหล่งเพาะพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่เหมาะสมแมลงวันอาจมีการเคลื่อนกระจายออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะ

ในกรณีที่แมลงวันมีการระบาดและมีความชุกชุมสูงมาก แมลงเหล่านี้จะเคลื่อนกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงระยะ 1 – 5 กิโลเมตร อาจจะเป็นกลุ่มบ้าน หรือหมู่บ้าน หรือฟาร์มปศุสัตว์ใกล้เคียงก็ได้

จากการศึกษาการเคลื่อนกระจายของแมลงวันโดยการแต้มสีแมลงวัน พบว่าแมลงวันสามารถเคลื่อนกระจายไปได้ 10 – 20 กิโลเมตร ห่างจากจุดปล่อย จากข้อมูลนี้แสดงว่าสามารถเคลื่อนกระจายได้ไกล แต่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าแมลงวันสามารถบินด้วยตัวเองได้ไกลเท่าใด แมลงวันอาจจะติดไปกับรถ โค กระบือ รถโดยสาร แท็กซี่ หรือรถขนของ รวมทั้งรถขยะด้วย ทิศทางการบินของแมลงวันยังไม่ทราบแน่ชัดนัก บางการศึกษา พบว่า แมลงวันบินสวนทิศทางลมที่พัดเอื่อย แต่บางการศึกษารายงานว่า แมลงวันบินตามทิศทางลมและบางครั้งบินขวางทิศทางลม

2.8.6 ความสำคัญของการแพทย์และสาธารณสุข

2.8.6.1 บทบาทและความเป็นไปได้ในการนำโรคติดต่อ แมลงวันบ้านสามารถนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคหนองพยาธิบางชนิด นอกจากนี้ยังมีผู้อ้างว่าสามารถนำโรคเรื้อน โปลิโอ และโรคผิวหนังบางชนิด เช่น คุดทะราด สำหรับ *M. sorbens* มีบทบาทที่สำคัญในการแพร่โรคติดต่อทางตา เช่น โรคตาแดง

1) แมลงวันบ้านมีนิสัยชอบเกาะกินอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น สิ่งปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่าง ๆ เศษสัตว์พืชเน่า ๆ ซึ่งโอกาสจะสัมผัสเชื้อโรคติดต่อจึงมีมาก

2) ได้มีการศึกษา พบว่า แมลงวันสามารถเป็นตัวพา (Carrier) เชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว ไข่และซิสต์พวกหนองพยาธิ ร่างกายทุกส่วนของแมลงวัน เช่น ปาก ลำตัว ขนต่าง ๆ ตามลำตัว และขาสามารถติดกับเชื้อโรคหลายชนิด

แมลงวันสามารถเป็นตัวพาเชื้อโรคเท่านั้น เชื้อโรคที่ติดกับตัวหนอนส่วนมากจะไม่สามารถเข้าไปเจริญขยายพันธุ์ในแมลงวันตัวเต็มวัย และเชื้อโรคที่ติดไปกับแมลงวันตัวเต็มวัยจะไม่เจริญขยายพันธุ์ในตัวแมลงวันเช่นกัน ส่วนใหญ่เชื้อโรคที่ติดไปกับแมลงวันจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน อาจจะตายไปใน 2 – 3 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามเชื้อโรคอาจเข้าไปอยู่ในกระเพาะและอุจจาระของแมลงวันซึ่งอาจมีชีวิตได้หลายวัน เมื่อแมลงวันไปสัมผัสมนุษย์มันอาจปล่อยเชื้อโรคโดยปล่อยไปพร้อมกับน้ำลาย

3) จากการทดลองพบว่าเชื้อโรคที่แมลงวันพามาสามารถทำให้คน สัตว์เป็นโรคและสามารถทำให้อาหารเสียด้วย

4) สถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตาแดงต่าง ๆ เกิดขึ้นสัมพันธ์กับฤดูชุกชุมของแมลงวันในท้องถิ่นนั้น ๆ

5) มาตรการควบคุมแมลงวันที่ได้ผลสามารถลดสถานการณ์ของโรคติดต่อทางเดินอาหารอย่างเห็นได้ชัด

2.8.6.2 โรคติดต่อที่แมลงวันอาจเป็นตัวแพร่โรค

โรคติดต่อที่กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค แต่ไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญของการแพร่โรค

1) โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่

(1) บิดมีเชื้อ (Shigellosis) ได้แก่ บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Shigella* spp.

(2) ไข้รากสาด (Salmonellosis) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Salmonella* spp.

(3) อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) ซึ่งเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรีย

(4) อหิวาตกโรค (Cholera) การแพร่โรคโดยแมลงวันอาจเกิดได้แต่ความสำคัญอาจมีไม่มากนัก

2) โรคที่เกิดจากโปรโตซัว

(1) บิดมีตัว (Amoebic Dysentery) แมลงวันอาจนำซิสต์ของอะมีบา (*Entamoeba histolytica*) ได้

3) หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถนำหรือพาหุซิสต์ของพยาธิได้หลายชนิด เช่น พยาธิเส้นด้าย (*Enterobius* spp.) พยาธิตัวกลม (*Ascaris* spp.) พยาธิปากขอ (*Ancylostoma* spp. และ *Necator* spp.) เป็นต้น

4) ไวรัส (Virus) แมลงวันสามารถนำพาไวรัสได้หลายชนิด เช่น โปลิโอ (Poliomyelitis) แต่อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคนี้สาเหตุที่แท้จริงอาจไม่ใช่เกิดจากแมลงวัน นอกจากนั้นการแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบในบางท้องถิ่นน่าจะเกิดจากแมลงวันได้เช่นกัน

โรคที่เกิดจากไวรัสที่สำคัญที่แมลงวันมีบทบาทมาก ได้แก่ โรคที่เกี่ยวข้องกับตา อาทิ Trachoma ซึ่งเกิดจากไวรัส และโรคตาแดงที่เกิดจากแบคทีเรีย (Epidemic Conjunctivitis) แมลงวันที่สำคัญ ได้แก่ *Musca sorbens*

5) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แผลงวันส่วนใหญ่ชอบบินมาเกาะแผลหรือแผลเรื้อรังสามารถนำเชื้อมาติดได้ เช่น คุตทะราด โรคเรื้อน แต่ความสำคัญของแผลงวันมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับการติดต่อทางอื่น

2.8.6.3 แผลงวันก่อให้เกิดความรำคาญ ในพื้นที่ที่แผลงวันชุกชุม จะพบว่าแผลงวันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความรำคาญมากที่สุดในร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนบริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาการทำงานไม่น้อย โดยเฉพาะระหว่างการรับประทานอาหาร เป็นตัวที่ก่อความยุ่งยากมากสำหรับคนไทย หากมีแผลงวันตกไปในชามหรือในภาชนะที่มีอาหารอยู่ จะทำให้ต้องเทอาหารทั้งหมดทิ้งไป ปัญหาแผลงวันมิใช่ก่อให้เกิดความรำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มผลิตนม หรือฟาร์มปศุสัตว์ โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านปศุสัตว์อย่างมหาดศาลได้

2.8.7 การควบคุมแผลงวัน

การควบคุมแผลงวันมีด้วยกันหลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินการ การควบคุมแผลงวันจะต้องคำนึงถึงชีววิทยาของแผลงวัน แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งเกาะพัก ตลอดจนความสัมพันธ์กับมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งความชุกชุมของแผลงวัน โดยทั่วไปการควบคุมแผลงวันระยะยาวจะต้องพิจารณาถึงมาตรการทางสุขภาพิบาล และมาตรการด้านสุขวิทยาเป็นสำคัญ (กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2539: 20 – 24) ดังนี้

2.8.7.1 วิธีการทางด้านสุขวิทยาและสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อม

1) การกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์แผลงวัน

(1) ขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนในหมู่บ้าน ถึงขยะต้องปิดมิดชิดเพื่อป้องกันแผลงวันและนำขยะไปฝังหรือเผาอย่างสม่ำเสมอ ส่วนบ้านเรือนในเขตเมืองควรมีภาชนะใส่ขยะที่มีฝาปิดหรือใส่ถุงปิดให้มิดชิดระหว่างรอรถขนขยะของเทศบาลหรือสุขภาพิบาล

(2) ขยะรวมของชุมชนนอกเขตเมือง ควรจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ นำไปฝังหรือเผาในที่ที่เหมาะสม

(3) ขยะมูลฝอยจากสถานบริการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานศึกษาต่าง ๆ ตลาดสด ตามโรงงานต่าง ๆ จะต้องจัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมป้องกันแผลงวัน ขยายพันธุ์ที่ตีเพียงพอ ภาชนะนั้นจะต้องจัดให้มีการทำความสะอาด ปิดให้มิดชิด มีการเก็บขน

ย้ายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ขยะมูลฝอยเหล่านี้หากทิ้งไว้เกิน 1 สัปดาห์ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวัน

(4) มูลสัตว์ต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนี้

- นำไปทำอุตสาหกรรมปุ๋ยคอกที่ปลอดแมลงวันพร้อมทั้งแนะนำการนำไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแมลงวัน

- การตากแห้งโดยแยกเป็นกองเล็ก ๆ หรือเกลี่ยกระจายซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก

- นำไปกลบฝังใต้ต้นไม้เพื่อให้เป็นปุ๋ย

- หากมีปริมาณมากเป็นกอง ให้นำแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่มาคลุมปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเจริญขยายพันธุ์ของแมลงวัน

(5) ฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด สุกร ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนที่ถูกต้อง จัดเตรียมสถานที่เก็บมูลสัตว์และวิธีการเก็บที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลี้ยงที่ครบวงจร เช่น การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา การเลี้ยงเปิด ไก่ บริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อควบคุมแมลงวัน การนำหนอนแมลงวันไปเป็นอาหารเปิด ไก่ เป็นต้น

2) การกำจัดและควบคุมแหล่งแมลงวันชุกชุม

กลิ่นของอาหารและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ มีความสำคัญที่ล่อและดึงดูดให้แมลงวันตัวเต็มวัยบินมารวมกันหนาแน่น แม้ว่าบริเวณใกล้เคียงจะไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ก็ตาม ดังนั้น การดำเนินการจะเป็นการสนับสนุนการทำความสะอาดสถานบริการ สถานศึกษา และโรงงานต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งสนับสนุนและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ควบคุมแมลงวัน เช่น เหยื่อล่อ กับดักชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การทำมุ้งลวดและการใช้สารเคมีที่จำเป็น นอกจากนั้นขยะมูลฝอยและเศษอาหารต่าง ๆ จะต้องมีสถานที่เก็บและให้มีการเก็บขยะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้ง

3) การให้การศึกษาและการให้ชุมชนรับผิดชอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดทำโครงการให้ความรู้ในเด็กนักเรียน สถานศึกษา สถานบริการและสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งวัด

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฤทธิ์อื่นไม่พึงประสงค์ในระยะยาวจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหรือไม่อย่างไร การนำไปใช้จึงควรต้องติดตามข้อมูลทางวิชาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

2.8.7.3 การใช้สารเคมีควบคุมแมลงวัน

การใช้สารเคมีควบคุมและกำจัดแมลงวันยังมีความจำเป็น และควรนำมาใช้ในแหล่งที่มีความชุกชุมของแมลงวันสูง แต่เนื่องจากแมลงวันมีการปรับตัวต้านสารเคมีได้รวดเร็วมาก ดังนั้น การใช้สารเคมีควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน เพราะแมลงวันจะเกิดการต้านสารเคมีข้ามกลุ่ม การใช้ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามคำแนะนำโดยละเอียด และควรต้องติดตามตรวจสอบความไวของแมลงต่อสารเคมีที่ใช้โดยสม่ำเสมอ

มาตรการการใช้สารเคมี ควรใช้ในกรณีที่เป็นเท่านั้น มาตรการที่พิจารณานำมาใช้มี 5 มาตรการ ตามลำดับดังนี้

1) การควบคุมหนอนแมลงวันที่แหล่งเพาะพันธุ์

มาตรการนี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องพ่นอัดแรงที่พ่นสารเคมีให้มีขนาดละอองน้ำยาที่มีขนาดใหญ่พอควรเพื่อสามารถทำให้พื้นผิวของแหล่งเพาะพันธุ์เปียกเล็กได้ระหว่าง 10 – 15 เซนติเมตร โดยใช้สารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟอรัส ได้แก่ ไตรคอร์ฟอน หรือไดอาซินอน พ่น 1 gm/m² หรือ Cyromazine 1 gm/m² อาจพิจารณานำมาใช้ตามความเหมาะสม แหล่งเพาะพันธุ์ที่จะใช้มาตรการนี้ ได้แก่ กองขยะ ที่เก็บขยะในตลาด สถานประกอบการ และสถานศึกษา โดยพ่นทุก 2 – 3 อาทิตย์

2) การพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างที่แหล่งเกาะพัก

มาตรการนี้ได้แนะนำให้ใช้น้อยที่สุดและใช้เฉพาะกรณีที่เป็นเท่านั้น เพื่อลดความชุกชุม โดยพิจารณาใช้เฉพาะแหล่งเกาะพักที่อยู่ใกล้แหล่งเพาะพันธุ์เท่านั้น สารเคมีที่นำมาใช้ได้ คือ เฟนิโตรไธออน 2 gm/m² หรือพิริมิฟอสเมทิล 2 gm/m² หรือแลมดาไซฮาโลทริน 25 gm/m²

3) การใช้สารเคมีขุบวัสดุแขวน

เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะพักในอาคารทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ตามเชือก หรือสายไฟ หรือวัสดุ ที่ห้อยระยงตามอาคาร เช่น ตลาด ร้านค้า โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร หรือโรงเรียนอื่น ๆ มาตรการนี้สามารถนำไปใช้ตามสถานที่ดังกล่าวโดยใช้เชือกป่านหรือวัสดุที่เหมาะสมยาวประมาณ 1 – 2 เมตร แล้วแต่ความสูงของอาคาร ขุบน้ำตาลผสมกากให้เป็นสีดำ ผสมด้วยสารเคมี เช่น ไดอาซินอน หรือเฟนิโตรไธออน หรือพิริมิฟอสเมทิล ความเข้มข้นร้อยละ 8 – 10 โดยเปลี่ยนวัสดุนี้ทุก 2 – 3 เดือน

4) การใช้เหยื่อพิษ

วิธีการนี้ได้แนะนำให้เอาไปใช้ในแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุม เช่น บริเวณร้านค้า โรงครัว โรงงานประกอบอาหารต่าง ๆ และแหล่งที่มีแมลงวันชุกชุมอื่น ๆ การทำเหยื่อพิษมีหลายวิธี เช่น

(1) เหยื่อชนิดแห้งเคลือบด้วยน้ำตาลผสมสารเคมี เช่น ใช้ทราย หรือเปลือกหอย หรือวัสดุเหยื่อล่ออื่น ๆ นำมาเคลือบ

(2) เหยื่อชนิดน้ำผสมด้วยน้ำตาลหรือสารล่ออื่น ๆ แล้วพ่นตามแหล่งที่คาดว่าแมลงวันชุกชุม

(3) เหยื่อชนิดของเหลวข้นเหนียว เป็นกาวดักโดยผสมกับน้ำตาลหรือสารล่อ โดยนำแห้งไม้ชุบตั้งไว้ตามแหล่งแมลงวันชุกชุม อาจชุบสารเคมีผสมด้วยก็ได้

(4) เหยื่ออาหารชนิดน้ำ เช่น นม หรือน้ำตาล ผสมร้อยละ 1 - 2 พอร์มัลดีไฮด์

สารเคมีที่ควรใช้ ได้แก่ โซเดียมอารซีไนต์ หรือเคมีกำจัดแมลงอื่น ๆ แต่ที่นิยม ใช้ได้แก่ ไดคลอวอล ผสมร้อยละ 0.25 ไตรคอร์ฟอน (ดิฟเทอเร็กซ์) หรือผสมเพนคลอวอล (นานคอร์)

ในฤดูผลไม้ ปลีอกทุเรียนสามารถล่อแมลงวันได้ดีมาก หากตัดส่วนในของปลีอกทุเรียนมาผสมกับสารเคมีข้างต้น ก็สามารถเป็นเหยื่อพิษล่าแมลงได้เป็นอย่างดี

5) การพ่นเคมีเฉพาะแห่ง (Space Spray) วิธีการนี้สามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่ควรหลีกเลี่ยงวิธีการนี้ นอกจากกรณีเกิดปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหาร จึงควรพิจารณานำมาใช้ตามความจำเป็นเท่านั้น สารเคมีที่อาจนำมาใช้ เช่น Deltacide Concentrate ซึ่งประกอบด้วย Deltamethrin, Esbioallethrin และ Piperonyl Butoxide หรืออาจใช้ Aqua Resigen ซึ่งประกอบด้วย Permethrin, S - bioallethrin และ Piperonyl Butoxide โดยใช้กับเครื่องพ่น ULV

2.8.7.4 การใช้วิธีทางกฎหมาย

การใช้วิธีการทางกฎหมายเป็นวิธีการสุดท้ายที่อาจนำมาพิจารณาใช้ในท้องที่ที่มีกฎหมายรองรับ เช่น เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เพื่อออกใช้บังคับฟาร์มปศุสัตว์ในเขตเมือง สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน นอกจากนั้นการประสานงานให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการป้องกันแมลงวันจะต้องมีการเร่งรัดที่เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความร่วมมือโดยสมัครใจ

2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วีระพล จันทร์สวรรค์, ณรงค์ จีงสมานญาติ, ศรีสมัย วิริยะรัมย์กะ, นิรชา โรจนแพทย์, จุรี ปานกำเหนิด และปิยวรรณ สุธรรมานินท์ (2536ก: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อแมลงวันบ้าน พบว่า สารสกัด 115 ชนิด ที่สกัดได้จากพืชตามธรรมชาติ มีสารสกัดที่ได้จาก น้อยหน่าฝ้าย (*Annona squamosa*) เป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าตัวแก่แมลงวันบ้านได้สูงสุดถึงร้อยละ 95.00 \pm 1.50 ส่วนสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงวันบ้านรองลงมา ได้แก่ มะรุม (*Moringa Oleifera* Lask) ใบยาสูบ (*Nicotiana tabacum* Linn) มะม่วงหิมพานต์ (*Anacardium occidentale* Linn) และว่านน้ำ (*Acorus calamus*) ซึ่งให้ผลในการฆ่าตัวแก่ของแมลงวันบ้าน 72.34 \pm 2.52, 71.82 \pm 2.55, 70.72 \pm 2.53 และ 70.21 \pm 1.80 ตามลำดับ และสารที่สกัดได้ทั้งหมดนี้จะมีสารอยู่ 3 ตัว ที่มีผลต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของแมลงวันบ้าน โดยการทำลายตัวอ่อนไม่ให้เจริญเติบโตจากตัวอ่อนระยะที่ 3 เป็นแมลงวันตัวแก่โดยเกินกว่าร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ซึ่งได้แก่ น้อยหน่าฝ้าย (*Annona squamosa* Linn) ร้อยละ 95.00 \pm 1.58 หัวใจสีม่วง (*Setcreasea purpurea* Boom) ร้อยละ 91.00 \pm 1.14 และหนอนตายหยาก (*Stemona collinsae* Graib) ร้อยละ 91.00 \pm 1.20

สมกิจ อนุวัชกุล และคณะ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้สมุนไพร กล้วยป่า หนอนตายหยาก และชอบชะนาง ควบคุมหนอนแมลงวันและแมลงวันในฟาร์มสัตว์ ปกติพบว่า สมุนไพร กล้วยป่าและชอบชะนางมีแนวโน้มในการออกฤทธิ์ต่อหนอนแมลงวันมากกว่าสมุนไพรหนอนตายหยากเมื่อสกัดด้วยเอทานอลและน้ำกลั่นในชั่วโมงแรกหลังการฉีดพ่น ส่วนการสกัดสมุนไพรด้วยเอทานอลทุกกลุ่มมีผลต่ออัตราการตายของหนอนแมลงวันร้อยละ 100 ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังการฉีดพ่น ซึ่งมากกว่าการใช้สารสกัดด้วยน้ำกลั่น สำหรับระดับของสารสกัดที่ใช้ฉีดพ่นบนหนอนแมลงวันระดับที่สูงขึ้นจะมีผลอัตราการตายของหนอนแมลงวันเพิ่มขึ้น แต่สมุนไพรที่สกัดในระดับความเข้มข้นเดียวกันมีผลต่อการตายของหนอนแมลงวันใกล้เคียงกัน รวมทั้งแมลงวันที่ฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกล้วยป่าและหนอนตายหยากด้วยเอทานอลมีอัตราการตายมากกว่าแมลงวันที่ฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากน้ำกลั่น ส่วนสารสกัดจากสมุนไพรหนอนตายหยากด้วยน้ำกลั่นมีประสิทธิภาพดีกว่าสารที่สกัดจากสมุนไพรกล้วยป่า

พรรณระพี อำนวยสิทธิ์, สมกิจ อนุวัชกุล และทินกร ทาตะกุล (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้สมุนไพรกล้วยป่าและหนอนตายหยากควบคุมพยาธิภายนอกไก่พื้นเมืองและโค ผลปรากฏว่า ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจำนวนพยาธิภายนอกในไก่พื้นเมืองที่ฉีดพ่นด้วยสาร

สกัดสมุนไพรทั้งสองชนิดและไม่พบความแตกต่างระหว่างระดับของสมุนไพรสกัดที่ใช้และวิธีการสกัด ในส่วนของเห็บโค ปรากฏว่า สมุนไพรหนอนตายหยากมีประสิทธิภาพดีกว่าสมุนไพรกรวยป่า ส่วนวิธีการสกัดด้วยสารเอทานอลมีผลต่ออัตราการตายของเห็บโคมากกว่าการสกัดด้วยน้ำกลั่น ในช่วง 4 และ 5 วันของการทดลอง นอกจากนี้ไม่พบอัตราการตายของเห็บโคในวันที่ 1, 2 และ 3 ของการทดลอง และเห็บโคที่ได้รับสารสกัดสมุนไพรตายหมดทุกกลุ่มในเวลา 11 วันของการทดลอง

สุทธาพันธ์ โพธิ์กำเนิด (2544: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรหนอนตายหยากผสมอาหารไก่เพื่อควบคุมหนอนแมลงวันในมูลไก่ ผลการศึกษา พบว่าการใช้สมุนไพรหนอนตายหยากมีผลทำให้ จำนวน ขนาด และน้ำหนักของหนอนแมลงวันที่เพาะจากมูลไก่ที่กินอาหารทดลองทุกระดับมีแนวโน้มลดลง ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันจากการใช้รากสมุนไพรหนอนตายหยากสภาพสดและสภาพแห้งคลุกผสมกับมูลไก่ควบคุมโดยตรง คือ จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของสมุนไพรหนอนตายหยากเพิ่มขึ้น โดยพบว่าที่ระดับร้อยละ 9.00 ของการใช้สมุนไพรมีประสิทธิภาพดีที่สุด ทั้งด้านสมรรถนะการผลิตของสัตว์และการควบคุมหนอนแมลงวัน

เมธี รุ่งโรจน์สกุล (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา จำนวนโครโมโซม และการขยายพันธุ์ของต้นหนอนตายหยาก (*Stemona* spp.) พบว่า ในลักษณะทางสัณฐานวิทยา ต้นหนอนตายหยาก สามารถแยกลักษณะต้นหนอนตายหยากได้ 6 ชนิด โดยระบุชื่อถึงระดับชนิดได้ 4 ชนิด คือ *Stemona curtisii* Hk.f., *Stemona kerrii* Craib, *Stemona burkillii* Prain และ *Stemona tuberosa* Lour. var. *tuberosa* ส่วนอีก 2 ชนิดยังระบุชนิดไม่ได้ให้ชื่อในเอกสารรูปวิธานเป็น *Stemona* sp. # 4 และ *Stemona* sp. # 5 โดยต้นหนอนตายหยากทั้ง 6 ชนิด มีจำนวนโครโมโซม $2n = 14$ ส่วนการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วน Tuberos Root พบว่า ต้นหนอนตายหยากทั้ง 6 ชนิด มีจำนวนรากและน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมทั้งการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต พบว่า *Stemona* spp. มีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน และในการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้เมล็ด พบว่า *Stemona curtisii* Hk.f. มีร้อยละการงอกดีที่สุดในที่สุด คือ ร้อยละ 59.00 มีจำนวนวันเฉลี่ยการงอกน้อยที่สุดในที่สุด คือ 33.76 วัน รวมทั้งการเจริญเติบโต พบว่า *Stemona curtisii* Hk.f. มีการเจริญเติบโตดีที่สุดในที่สุด

วาสนา ไชยคำ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (*Stemona* spp.) และเถาวัลย์เปรียง (*Derris scandens* Benth.) ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดหยาบโคคลอโรมีเทนจากหนอนตายหยากและเถาวัลย์เปรียงแสดงความเป็นพิษสูงต่อหนอน

กระทู้ผัก โดยมีอัตราการตายที่ระดับความเข้มข้น 40,000 พีพีเอ็ม เป็นร้อยละ 46.00 และ 44.00 ตามลำดับ การทดสอบความเป็นพิษกับด้วงวงข้าวโพด พบว่า สารสกัดหยาบร้อยละ 70.00 เมทานอลจากหนอนตายหยากแสดงความเป็นพิษสูงสุดโดยมีอัตราการตายร้อยละ 48.00 ที่ระดับความเข้มข้น 50,000 พีพีเอ็ม ในกรณีของเถาวัลย์เปรียงสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนแสดงความเป็นพิษสูงสุด โดยมีอัตราการตายร้อยละ 40.00 ที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน และการทดสอบกับลูกน้ำยุงลาย พบว่า สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนจากหนอนตายหยากและเถาวัลย์เปรียงแสดงความเป็นพิษสูงสุดโดยมีอัตราการตายร้อยละ 100.00 ที่ระดับความเข้มข้น 500 พีพีเอ็ม และ 250 พีพีเอ็ม ตามลำดับ

สุภาณี พิมพ์สมาน และยนต์ สุตะภักดี (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของสารจากพืชท้องถิ่นในพื้นที่โคกภูตากาในการควบคุมแมลง โดยได้นำส่วนรากหนอนตายหยากแห้งที่สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ Methanol, Dichloromethane และ Hexane ด้วยวิธี Soxhlet Extraction มาทดสอบฤทธิ์ฆ่าแมลงกับหนอนกระทู้ผัก (*Spodoptera litura* Frab.) วัย 2 ด้วยวิธี Topical Application พบว่า ได้ค่า LD₅₀ ที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0016, 0.0035 และ 0.0028 มิลลิกรัมต่อตัว ตามลำดับ และวิธี Leaf Dip Feeding Test ได้ค่า LC₅₀ ที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 2,644, 6,122 และ 3,653 พีพีเอ็ม ตามลำดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดรากหนอนตายหยากด้วย Methanol มีศักยภาพสูงที่จะนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงที่มีอันตรายสูงได้

อาทิตย์ บัวระภา (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดรากหนอนตายหยากและ *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* ต่อหนอนแมลงวันบ้าน สรุปลงได้ว่า สารสกัดหนอนตายหยากและ Bti มีความเป็นพิษต่อหนอนแมลงวันบ้าน สามารถใช้ควบคุมหนอนแมลงวันบ้านได้ โดยสารสกัดหนอนตายหยากมีพิษมากที่สุดต่อหนอนแมลงวันบ้านระยะที่ 1 (LC₅₀ เท่ากับ 3.26 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม ที่ 72 ชั่วโมง) ส่วน Bti มีพิษมากที่สุดต่อหนอนแมลงวันบ้านระยะที่ 1 เช่นกัน (LC₅₀ เท่ากับ 3.45 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม ที่ 72 ชั่วโมง) ทั้งนี้สารสกัดหนอนตายหยากมีความเป็นพิษสูงกว่า Bti และเมื่อใช้ร่วมกันพบว่าสารสกัดหนอนตายหยากและ Bti ไม่เสริมฤทธิ์ในการกำจัดหนอนแมลงวันเพราะอัตราการตายของหนอนแมลงวันบ้านไม่ได้สูงไปกว่าการใช้สารสกัดหนอนตายหยากหรือ Bti อย่างเดียว

กิตติศักดิ์ โชติเดชานรงค์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (*Stemona* spp.) ในสภาพปลอดเชื้อ ผลการศึกษา พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด ช่อ และตาที่อยู่เหนือกระจกราก ของต้นหนอนหนอนตายหยาก (*Stemona* spp.) บนอาหารวุ้นสูตร

MS (1962) ที่เติม BA ความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัม/ลิตร พบว่า ปลายยอด และตาที่อยู่เหนือกระจุกราก ที่เลี้ยงบนอาหาร MS เติม BA 2 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน สามารถชักนำให้เกิด Multiple Shoot (ร้อยละ 70.00) ราก (ร้อยละ 20.00) และแคลลัส (ร้อยละ 71.25) ได้มากที่สุด

สุมนา นิระ, ปรีชา นิระ และรวมชาติ แต่พงษ์โสภณ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรดันหนอนตายหยาก พบว่า ใบอ่อนที่เลี้ยงในอาหารสูตร B₅ ที่เติม 2, 4 - D ความเข้มข้น 0.5 ppm ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 3 ppm ในสภาพที่มีแสงสามารถชักนำให้ใบอ่อนพัฒนาเป็นแคลลัสได้เท่านั้น ส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนของข้อของดันหนอนตายหยาก พบว่า ในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 1 ppm ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 4 ppm ในสภาพที่สว่างสามารถชักนำให้เกิดต้นมากที่สุด 19.80 ต้นต่อชิ้นส่วน สำหรับการศึกษากการเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรดันหนอนตายหยากในสภาพแปลงปลูก พบว่า การปลูกหนอนตายหยากด้วยรากจำนวน 12 รากมีผลให้ดันหนอนตายหยากมีน้ำหนักสดของผลผลิตสูงที่สุด (46.40 กรัม) แต่การเจริญเติบโตทุกหน่วยทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และคณะ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษากการผลิตและการขยายพันธุ์หนอนตายหยาก ผลการศึกษา พบว่า หากประสงค์จะขยายพันธุ์โดยเมล็ดสามารถกระทำได้โดยนำเมล็ดจากฝักอ่อน (เมล็ดมสีแดงชมพู) มาเพาะในอาหารสูตร MS หรือสูตร MS ที่เติมสาร GA ร้อยละ 0.005 ซึ่งเมล็ดสามารถงอกได้เท่ากับร้อยละ 20.00 และ 60.00 ตามลำดับ สำหรับการชักนำยอดจากส่วนยอด พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมสาร BA ที่ระดับความเข้มข้น 2.50, 5.00 และ 7.50 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนำจำนวนยอดได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และการชักนำยอดจากส่วนของปล้อง ราก และใบ ไม่สามารถชักนำยอดได้ในอาหารสูตรดังกล่าว ส่วนการชักนำรากเพื่อพัฒนาเป็นต้นใหม่ พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมสาร IBA ระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 3 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถชักนำการเกิดรากได้สูงสุด (เท่ากับร้อยละ 100, 100 และ 96.67 ตามลำดับ)

กฤตชญา อิศกุล (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสมบัติและความคงฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดสารภี *Mammea siamensis* (Miq.) T. And. และรากหนอนตายหยาก *Stemona curtisii* Hk. f. ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ พบว่า การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำของสารสกัดจากพืชทั้ง 2 ชนิดในสภาพแปลงเกษตรกร สารสกัดจากเมล็ดสารภีทั้ง 2 สูตรมีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมปริมาณแมลงชนิดต่าง ๆ ในแปลงปลูก ส่วนสารสกัดจากรากหนอนตายหยากมีแนวโน้มที่ดีในการควบคุมปริมาณหนอนในแปลงปลูกพืช

ตระกูลกะหล่ำ รวมทั้งความคงฤทธิ์ของสารสกัดทั้ง 3 สูตรที่เก็บไว้ในสภาวะที่แตกต่างกัน 3 สภาวะ ได้แก่ อุณหภูมิตู้เย็น อุณหภูมิห้อง และกลางแจ้ง พบว่า สารสกัดทั้ง 3 สูตรที่เก็บไว้ใน อุณหภูมิตู้เย็นยังคงฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการทดลองในเดือนที่ 6 และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสารสกัดทั้ง 3 สูตร พบว่า ความชุ่มและสีของสารสกัดทุกสูตรเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสภาวะการเก็บที่แตกต่างกัน

บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง สรุปได้ว่า หนอนตายหยากเป็นพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าไวรัส พยาธิ เชลล์มะเร็ง เห็บโค หนอนแมลงวัน และไรไก่ได้ดี โดยเฉพาะเมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายชนิดที่มีขั้วน้อย จึงควรได้มีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้กำจัดศัตรูของสัตว์เศรษฐกิจเพื่อทดแทนสารเคมีต่อไป

ภายหลังจากที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า รากสมุนไพรหนอนตายหยากมีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมการเกิดและการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน จึงมีความเป็นไปได้ในการกำจัดหนอนแมลงวันบ้านในรูปของน้ำสกัดชีวภาพ ซึ่งยังไม่มีมีการวิจัยการใช้รากสมุนไพรหนอนตายหยากในสภาพการหมักมาก่อน